



ANEXO 3: Indicadores de progreso de país





Anexo 3

ANEXO 3* : INDICADORES DE PROGRESO DE PAÍS

Hasta marzo de 2006, 115 países habían facilitado informes sobre los progresos realizados en la aplicación de la Declaración de compromiso sobre el VIH/SIDA, dentro de sus Informes nacionales de 2005 sobre los progresos realizados que presentaron al ONUSIDA. Los indicadores para los cuales se facilitó información se derivaban de la *Declaración de compromiso sobre el VIH/SIDA del UNGASS* (2001) original. Los datos que aparecen en los siguientes cuadros guardan relación con los datos de los Informes nacionales sobre los progresos realizados y con información procedente de otras fuentes.

Más de 70 países utilizaron el Sistema de información de la respuesta nacional (CRIS) del ONUSIDA para recopilar y presentar los datos de sus indicadores pertinentes. Esto no solamente representa un avance extraordinario en la presentación de datos, sino que también proporciona lo que probablemente sea la fuente de datos más abundante sobre el compromiso mundial de responder al VIH, sobre la situación de la epidemia mundial y sobre las respuestas nacionales.

Desde que fue publicado el primer informe del UNGASS sobre los progresos realizados, *Seguimiento del UNGASS de 2001: Informe sobre los progresos realizados en la respuesta mundial al VIH/SIDA*, en 2003, se han perfeccionado y consolidado los indicadores básicos para la presen-

tación de informes en 2005 en colaboración con los asociados mundiales y el Grupo de Referencia del ONUSIDA sobre Vigilancia y Evaluación (MERG), el grupo internacional que establece las normas relativas a vigilancia y evaluación. Las explicaciones sobre cómo se desarrollaron los indicadores pueden consultarse en el documento siguiente en la página web del ONUSIDA: *Vigilancia de la Declaración de compromiso del UNGASS sobre el VIH/SIDA: Directrices para el desarrollo de indicadores básicos*, de julio de 2005.

Se pidió a todos los países, con independencia de su situación económica o epidemiológica, que informasen sobre todos los indicadores, según fuera apropiado. Estos indicadores incluían los gastos relativos al VIH/SIDA y al desarrollo

y ejecución de políticas como parte del Índice compuesto de política nacional. Dicho índice fue ampliado sustancialmente desde 2003, para cubrir la información sobre el estado de la planificación estratégica, el apoyo político, la vigilancia y evaluación, los programas de prevención, atención y apoyo, las cuestiones relativas a los derechos humanos, y la participación de la sociedad civil. Los grupos de datos completos estarán disponibles en la página web del ONUSIDA.

Los indicadores relativos a las epidemias generalizadas, que en adelante pasarán a denominarse indicadores EG, están concebidos para medir los progresos realizados en los programas nacionales (EG-3 a EG-9), los conocimientos y el comportamiento (EG-10 a EG-14), y el impacto (EG-15 a EG-17) en las epidemias generalizadas; en total hay 17 indicadores. Con la excepción de los dos indicadores del impacto, de los cuales se proporciona información en el Anexo 1 (Perfiles de país) y el Anexo 2 (Estimaciones y datos sobre el VIH y el SIDA, 2005), todos los datos disponibles sobre los indicadores de epidemia generalizada (EG) se facilitan en el presente anexo.

Los nuevos indicadores para situaciones en las que las epidemias son concentradas o de prevalencia baja (en adelante denominados indicadores ECPB) también pueden ser pertinentes para los países con epidemias generalizadas. Miden los progresos realizados en las pruebas del VIH y los programas de prevención para las poblaciones más expuestas (ECPB-3 a ECPB-4), el conocimiento y comportamiento de las poblaciones más (ECPB-5 a ECPB-8) y el impacto sobre las poblaciones más expuestas (ECPB-9). Con la excepción del indicador del impacto, del cual se proporciona información en los anexos

precedentes, todos los datos disponibles sobre los indicadores de epidemia concentrada o de prevalencia baja (ECPB) se facilitan en el presente anexo. Por consiguiente, si bien en total hay 23 indicadores de progreso de país, en este anexo se facilitan datos obtenidos de 20 indicadores.

Los cuadros de datos de los indicadores

Cuando los indicadores y los métodos utilizados en los dos años en que se rindió informe son congruentes, se facilitan datos para ambos años para que el lector pueda examinar los cambios producidos en el tiempo. Si es posible, se distingue el año en que fueron recopilados los datos del año en que se presentó la información. Los porcentajes y cifras que aparecen en los cuadros se han redondeado al punto decimal más cercano. Sin embargo, para calcular los promedios o medianas ponderados, se han utilizado cifras sin redondear, de manera que puede haber discrepancias de poca importancia. El lector observará variaciones sustanciales en algunos indicadores a lo largo de los países y regiones. Dichas variaciones se señalan en la discusión de estos datos en el capítulo “Avances en los países,” donde por lo general se presentan y discuten los márgenes globales reales. Algunos de los datos proporcionados en los informes sobre los progresos realizados por los países estaban aún en proceso de revisión con los países en el momento de imprimir este anexo. En tales casos, esto se hace constar explícitamente en los Cuadros de datos de los indicadores. A medida que pase a disponerse de más datos estos cuadros se actualizarán y se publicarán en la página web del ONUSIDA.

Téngase en cuenta que cuando un país no ha aportado datos para un indicador específico pero éstos estaban disponibles de otras fuentes, como la Encuesta de cobertura, el Informe mundial de la OMS “Tres millones para 2005” o las Encuestas Demográficas y de Salud, dichos datos se han incluido en los cuadros y no necesariamente son los datos oficiales proporcionados por los gobiernos nacionales. En tales casos, se indican claramente la fuente

y fecha del dato en los Cuadros de datos de los indicadores, se facilita la definición del indicador específico utilizada y se proporciona una referencia para la fuente en la sección Notas que acompaña al presente Anexo 3. Estos cuadros son el resultado del trabajo de compilación y elaboración realizado a partir de diversas fuentes por el personal del ONUSIDA en la sede en Ginebra, que no se hace responsable de la precisión de los datos de la fuente original.

*NOTA: Los países que figuran en los Anexos aparecen ordenados alfabéticamente como en la versión inglesa.

Lista de países que presentaron informes nacionales sobre la aplicación de la Declaración de compromiso en 2005 (N = 126)

ASIA ORIENTAL Y PACÍFICO

1. China
2. Estados Federados de Micronesia
3. Mongolia

10. Federación de Rusia
11. Eslovaquia
12. Tayikistán *
13. Ucrania

ASIA MERIDIONAL Y SUDORIENTAL

1. Bangladesh
2. Camboya
3. India
4. Indonesia*
5. Irán, República Islámica del
6. Lao, República Democrática Popular
7. Malasia
8. Nepal
9. Pakistán
10. Filipinas
11. Sri Lanka
12. Tailandia
13. Viet Nam

EUROPA OCCIDENTAL

1. Albania
2. Macedonia
3. Serbia y Montenegro

AMÉRICA LATINA

1. Argentina*
2. Belice
3. Brasil*
4. Chile
5. Colombia*
6. Costa Rica
7. Ecuador
8. El Salvador
9. Guatemala
10. Honduras
11. Nicaragua
12. Panamá
13. Paraguay*
14. Perú
15. Uruguay
16. Venezuela

OCEANÍA

1. Fiji
2. Kiribati*
3. Islas Marshall*
4. Nauru*
5. Islas Norfolk*
6. Palau
7. Samoa*
8. Islas Salomón*
9. Tokelau*
10. Tuvalu*
11. Vanuatu*

EUROPA CENTRAL Y ASIA CENTRAL

1. Armenia
2. Belarús
3. República Checa
4. Georgia
5. Kirguistán
6. Letonia
7. Moldova, República de
8. Polonia
9. Rumania

CARIBE

1. Antigua y Barbuda
2. Barbados
3. Cuba
4. Dominica
5. Haití
6. Jamaica
7. Saint Kitts y Nevis
8. Santa Lucía
9. San Vicente y las Granadinas
10. Trinidad y Tabago

*Sin texto descriptivo, solamente datos de los indicadores

ÁFRICA DEL NORTE Y ORIENTE MEDIO

1. Argelia
2. Marruecos
3. Turquía

ÁFRICA SUBSAHARIANA

1. Angola
2. Benin
3. Botswana
4. Burkina Faso
5. Burundi
6. Camerún *
7. República Centroafricana
8. Chad
9. Comoras
10. Congo
11. Congo, República Democrática del
12. Côte d'Ivoire
13. Etiopía
14. Gabón
15. Gambia
16. Ghana
17. Guinea
18. Guinea-Bissau
19. Kenya
20. Lesotho *
21. Madagascar
22. Malawi
23. Malí
24. Mozambique
25. Namibia

26. Nigeria
27. Rwanda
28. Senegal
29. Seychelles*
30. Sierra Leona
31. Somalia
32. Sudáfrica
33. Swazilandia
34. Tanzania, República Unida de
35. Togo
36. Uganda
37. Zambia
38. Zanzíbar
39. Zimbabwe

PAÍSES DE INGRESOS ALTOS

1. Australia
2. Austria*
3. Alemania
4. Guam*
5. Irlanda
6. Israel
7. Japón
8. Malta
9. Países Bajos
10. Nueva Zelandia
11. Noruega
12. Suecia
13. Suiza
14. Reino Unido
15. Estados Unidos de América

*Sin texto descriptivo, solamente datos de los indicadores

EG-1: Gasto público nacional relativo al SIDA en países de ingresos bajos y medianos, 2001–2005								
Países	Fuentes de la estimación	Metodología utilizada	Tipo de información presentada	Gasto público nacional (en millones de US\$)				
				2001	2002	2003	2004	2005
Caribe								
Antigua y Barbuda	Informe del UNGASS	Sistema de vigilancia de la financiación						\$0.40
Barbados	SIDALAC e Informe del UNGASS	NASA	Gastos			\$4.20	\$4.60	\$3.30
Dominica*	Informe del UNGASS	PD	PD					\$0.00
Haití	SIDALAC	NASA	Gastos		\$0.10	\$0.10		
Jamaica	Proyecto Flujos de Recursos e Informe del UNGASS	Análisis de presupuesto	Gastos			\$2.00	\$4.70	
San Kitts y Nevis*	Informe del UNGASS	Análisis de presupuesto	Gastos			\$0.10	\$0.10	\$0.10
Santa Lucía	Informe del UNGASS	Asignaciones presupuestarias	Gastos					\$2.20
San Vicente y las Granadinas*	Informe del UNGASS y PHR+	NAA incorporado en NHA	Gastos				\$0.50	\$0.50
Trinidad y Tabago	Informe del UNGASS y SIDALAC	NASA	Gastos	\$3.00	\$4.50	\$5.90		
Asia oriental								
China, República Popular de	Informe del UNGASS	Asignaciones presupuestarias	Presupuesto			\$47.20	\$98.00	\$99.30
Mongolia*	Informe del UNGASS	Asignaciones presupuestarias	Desembolsos					\$0.20
Europa oriental y Asia central								
Armenia	Informe del UNGASS	PD	Gastos	\$0.10	\$0.00	\$0.10	\$0.20	\$0.30
Belarús	Informe del UNGASS y Proyecto Flujos de Recursos	Sistema de vigilancia de la financiación	Gastos	\$0.70			\$5.80	\$6.10
República Checa	Informe del UNGASS	PD	Gastos				\$1.00	\$1.40
Estonia	Proyecto Flujos de Recursos	Encuesta sobre Flujos de Recursos	Gastos	\$0.50				
Georgia	Informe del UNGASS	Análisis de presupuesto	Gastos			\$0.40	\$0.50	\$0.60
Kirguistán*	Informe del UNGASS	PD	Gastos				\$0.20	
Letonia	Informe del UNGASS	Asignaciones presupuestarias	Gastos estimados					\$1.00
Lituania	Proyecto Flujos de Recursos	Encuesta sobre Flujos de Recursos	Gastos	\$0.80				
Moldova	Informe del UNGASS	Encuesta especial	Gastos			\$0.40	\$0.40	\$0.40
Rumania	CRIS UNFPA/ONUSIDA/ NIDI	Examen teórico	Gastos			\$29.70	\$36.20	\$42.70
Federación de Rusia	Informe del UNGASS	NASA	Gastos				\$33.40	
Tayikistán*	Informe del UNGASS	PD	Gastos					\$0.30
Ucrania	Informe del UNGASS	NAA incorporado en NHA	Gastos				\$3.90	

EG-1: Gasto público nacional relativo al SIDA en países de ingresos bajos y medianos, 2001–2005								
Países	Fuentes de la estimación	Metodología utilizada	Tipo de información presentada	Gasto público nacional (en millones de US\$)				
				2001	2002	2003	2004	2005
América Latina								
Argentina	SIDALAC e Informe del UNGASS	NASA	Gastos	\$123.90	\$152.30	\$77.50	\$89.60	\$115.20
Belice	SIDALAC	NASA	Gastos	\$0.40	\$0.50	\$1.10		
Chile	Informe del UNGASS y SIDALAC	NASA	Gastos	\$8.80	\$10.70		\$25.20	
Colombia	SIDALAC	NASA	Gastos	\$35.90	\$36.00			
Costa Rica	SIDALAC	NASA	Gastos	\$8.10	\$7.50	\$6.40		
Ecuador	Informe del UNGASS	Presupuesto	PD			\$0.60	\$2.50	\$6.80
El Salvador	Informe del UNGASS	NASA	Gastos	\$7.90	\$16.90	\$22.30	\$23.70	
Guatemala*	SIDALAC	NASA	Gastos		\$9.10	\$11.20		
Guyana	SIDALAC y RF 2003	NASA	Gastos	\$0.40	\$0.70	\$0.80		
Honduras*	Informe del UNGASS y SIDALAC	Presupuesto	Gastos	\$6.60				\$6.20
México	SIDALAC	NASA	Gastos	\$183.90	\$196.80			
Nicaragua	Informe del UNGASS y SIDALAC	NASA	Gastos	\$3.50	\$3.40	\$3.50	\$3.30	
Panamá	SIDALAC e Informe del UNGASS	NASA	Gastos	\$12.50	\$10.00	\$9.70		
Paraguay*	SIDALAC e Informe del UNGASS	Asignaciones presupuestarias	Desembolsos	\$0.90	\$0.80			\$0.70
Perú	Informe del UNGASS	Asignaciones presupuestarias	Gastos			\$2.10	\$4.30	
Uruguay*	Informe del UNGASS y SIDALAC	NASA	Gastos	\$8.60	\$7.50			\$3.80
Venezuela	Informe del UNGASS	Asignaciones presupuestarias	Gastos	\$44.50	\$36.80	\$30.20	\$29.20	\$28.20
África del Norte y Oriente Medio								
Argelia	Informe del UNGASS	Sistema de vigilancia de la financiación	Compromisos					\$6.70
Marruecos	Informe del UNGASS	Ninguna	Desembolsos			\$1.50	\$1.50	\$1.50
Turquía*	Proyecto Flujos de Recursos	Encuesta sobre Flujos de Recursos	Gastos	\$1.40		\$3.00		
Ocenania								
Fiji	Informe del UNGASS	Asignaciones presupuestarias	Presupuesto			\$0.10	\$0.20	\$0.30
Micronesia	Informe del UNGASS	PD	Gastos				\$0.00	
Palau	Informe del UNGASS	PD	Gastos				\$0.00	
Asia meridional y sudoriental								
Camboya	Informes del IHPP NASA y del UNGASS	NASA	Gastos	\$0.40	\$1.40	\$0.80	\$1.00	
India*	Informes del UNGASS y la NASA	NASA	Gastos	\$41.70	\$44.40	\$41.10	\$73.30	
Indonesia	Informe del UNGASS	NASA simplificada	Desembolsos presupuestarios	\$3.00	\$3.50	\$6.40	\$9.60	\$13.00

EG-1: Gasto público nacional relativo al SIDA en países de ingresos bajos y medianos, 2001–2005								
Países	Fuentes de la estimación	Metodología utilizada	Tipo de información presentada	Gasto público nacional (en millones de US\$)				
				2001	2002	2003	2004	2005
Irán, República Islámica del	Informe de Proyecto Flujos de Recursos y del UNGASS	Asignaciones presupuestarias	Desembolsos presupuestarios	\$4.20			\$14.00	
Lao, República Democrática Popular	Informe del IHPP NASA	NASA	Gastos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Nepal*	Informe del UNGASS	Asignaciones presupuestarias	Gastos			\$0.10	\$0.10	
Pakistán	Informe del UNGASS	Asignaciones presupuestarias	Gastos	\$2.90	\$2.40	\$0.50	\$2.60	\$2.40
Filipinas*	Informes del UNGASS y el IHPP NASA	NASA	Gastos	\$0.60	\$0.80	\$0.70	\$0.60	\$0.60
Sri Lanka	Informe del UNGASS	Asignaciones presupuestarias	Desembolsos					\$3.00
Tailandia*	IHPP NASA Report	NASA	Gastos	\$50.00	\$62.70	\$70.20	\$92.80	
Viet Nam*	Informe del UNGASS y Proyecto Flujos de Recursos	Asignaciones presupuestarias	Presupuesto	\$4.80		\$4.40	\$5.60	\$5.60
África subsahariana								
Angola	Informe del UNGASS	Encuesta especial	Gastos				\$8.90	
Benin*	Informe del UNGASS	Informe sobre actividades de los programas	PD				\$10.60	
Botswana	Informe del UNGASS	Informe sobre actividades de los programas	Gastos	\$69.80				\$165.00
Burkina Faso	Informe del UNGASS	NASA y vigilancia financiera	Gastos	\$2.20	\$5.40	\$9.30	\$11.00	\$8.00
Burundi**	Informe del UNGASS	Asignaciones presupuestarias	Gastos		\$5.70	\$5.70	\$18.60	\$14.00
Camerún*	Informe del UNGASS	PD	Gastos					\$4.40
República Centroafricana	Informe del UNGASS y Proyecto Flujos de Recursos	Encuesta sobre Flujos de Recursos	Gastos			\$0.60		\$0.70
Chad	Informe del UNGASS	PD	Gastos			\$0.20	\$0.50	\$0.90
Congo	Informe del UNGASS	PD	Asignaciones presupuestarias			\$0.10	\$0.10	\$4.70
Congo, Rep. Democrática del	Informe del UNGASS	Asignaciones presupuestarias	Presupuesto					\$3.60
Côte d'Ivoire	Informe del UNGASS	PD	Gastos			\$1.80	\$5.20	\$5.80
Gabón	Informe del UNGASS	Asignaciones presupuestarias						\$6.70
Gambia	Informe del UNGASS	Encuesta especial	Gastos				\$5.50	
Ghana	Informe del UNGASS y SIDALAC	NASA	Gastos		\$2.50	\$9.30		
Guinea, República de	Informe del UNGASS	Asignaciones presupuestarias	Gastos		\$0.20	\$0.20	\$0.30	
Guinea-Bissau**	Informe del UNGASS	PD	Gastos	\$0.50	\$0.50	\$0.50	\$0.50	
Kenya*	PHR+ e Informe del UNGASS	Presupuesto	Gastos		\$22.10	\$33.10	\$33.20	

EG-1: Gasto público nacional relativo al SIDA en países de ingresos bajos y medianos, 2001–2005

Países	Fuentes de la estimación	Metodología utilizada	Tipo de información presentada	Gasto público nacional (en millones de US\$)				
				2001	2002	2003	2004	2005
Lesotho	Informe del UNGASS	Encuesta especial	Gastos				\$1.30	\$1.40
Liberia	Informe de la NASA	Parcial NASA	Gastos				\$0.10	
Madagascar	Informe del UNGASS	Asignaciones presupuestarias	Presupuesto			\$0.10	\$0.20	\$0.20
Malawi	Informe del UNGASS	Asignaciones presupuestarias	Gastos	\$3.10	\$4.50	\$5.40	\$10.70	\$8.70
Malí	Informe del UNGASS	Encuesta especial	Gastos				\$3.50	
Mauricio	Informe de la NASA	NASA	Gastos				\$0.10	
Mozambique	Informe del UNGASS	NASA	Gastos				\$2.60	
Namibia*	Informe del UNGASS	Asignaciones presupuestarias	Gastos			\$35.00		\$38.60
Nigeria	Informe del UNGASS	NASA	Gastos			\$6.40	\$6.50	
Rwanda	Informe del UNGASS	NHA o NASA independiente	Gastos			\$1.30	\$2.70	\$1.70
Senegal	Informe del UNGASS	NASA	Gastos			\$5.90	\$11.90	
Sudáfrica*	Informe del UNGASS	Estimaciones nacionales de gastos	Gastos	\$79.50	\$121.20	\$219.20	\$340.50	\$446.50
Swazilandia	Informe del UNGASS	Asignaciones presupuestarias	Presupuesto			\$2.60		\$4.00
Togo*	Informe del UNGASS	PD	Gastos			\$0.70	\$0.90	\$0.60
Uganda	Informe del UNGASS	Estimaciones presupuestarias	Gastos				\$18.80	
Tanzania, Rep. Unida de	Informe del UNGASS	Asignaciones presupuestarias	Presupuesto	\$2.80		\$5.60	\$22.10	\$45.00
Zambia*	Informe del UNGASS	Asignaciones presupuestarias	Presupuesto					\$32.00
Zimbabwe	Informe del UNGASS	PD	Desembolsos			\$6.30	\$9.90	\$12.10
Europa occidental								
Macedonia	Informe del UNGASS	Asignaciones presupuestarias	Gastos					\$0.20
Serbia y Montenegro*	Informe del UNGASS	NASA	Gastos	\$0.20 [†]		\$0.20 [†]	\$5.60 ^{††}	\$6.30 [†] \$0.40 ^{††}
				(N = 95)			(N = 63)	(N = 54)

*Se trata de cifras preliminares y sometidas a revisión bien por la necesidad de asegurar que sean exhaustivas e incluyan exclusivamente fondos públicos nacionales, o bien porque no se empleó tiempo suficiente en las aclaraciones, existen diferencias en el periodo de referencia o los países las consideraron estimaciones parciales.

†Los informes del país incluían estimaciones combinadas de diversos años. Es necesario seguir trabajando para desglosar la información por años.

[†]Valor relativo a Montenegro

^{††}Valor relativo a Serbia

NASA = National AIDS Spending Assessment (Evaluación Nacional del Gasto relativo al SIDA)

PD = Por determinar

IHPP = International Health Policy Program (Programa Internacional de Políticas de Salud), Tailandia

SIDALAC = Iniciativa Regional de América Latina y el Caribe sobre el SIDA

EG-3: Educación escolar sobre el VIH basada en aptitudes para la vida						
País	2003			2005*		
	Informe de país del UNGASS, 2003			Informe de país del UNGASS, 2005		
	Porcentaje de escuelas con maestros que han recibido formación en educación sobre el VIH basada en aptitudes para la vida y que la impartieron en el último año			Porcentaje de escuelas con maestros que han recibido formación en educación sobre el VIH basada en aptitudes para la vida y que la impartieron en el último año		
	Primaria	Secundaria	Global	Primaria	Secundaria	Global
África subsahariana						
Botswana			50.0			
Burundi				100.0	0.0	78.9
Cabo Verde			0.0			
Rep. Centroafricana				-	-	-
Côte d'Ivoire				0.0	38.4	19.3
Etiopia	100.0	77.0	97.0	75.0	81.8	
Guinea				-	-	-
Kenya			5.0	61.6	49.4	60.8
Malawi			6.2	100.0	100.0	100.0
Malí				82.7	73.8	77.2
Mauricio	100.0	30.0				
Nigeria						19.0
Seychelles	88.5	77.0	84.5			
Swazilandia			25.0			90.2
Tanzania, Rep. U. de			19.0			
Togo				0.0	40.4	7.1
Uganda	100.0					
Zambia			1.5			60.0
Zimbabwe			75.0			
Asia oriental y Pacífico						
Mongolia	3.3	67.7	35.5			
Asia meridional y sudoriental						
Lao, Rep. D. Popular			7.7			
Myanmar	32.0	46.5	39.0			
Tailandia			100.0	-	-	-
Viet Nam	100.0	100.0	100.0			
Europa oriental y Asia central						
Armenia		15.5				
Kazajistán	0.0	54.7				
Kirguistán		13.0				
Federación de Rusia			100.0			
Tayikistán		3.0				
África del Norte y Oriente Medio						
Jordania		26.0				
Marruecos			28.0			
Caribe						
Antigua y Barbuda				-	-	-
Barbados			100.0			
Dominica				100.0	100.0	100.0
República Dominicana			18.8			
Santa Lucía						11.1
San Vicente y las Granadinas						22.8
Trinidad y Tabago				-	-	-

EG-3: Educación escolar sobre el VIH basada en aptitudes para la vida						
País	2003			2005*		
	Informe de país del UNGASS, 2003			Informe de país del UNGASS, 2005		
	Porcentaje de escuelas con maestros que han recibido formación en educación sobre el VIH basada en aptitudes para la vida y que la impartieron en el último año			Porcentaje de escuelas con maestros que han recibido formación en educación sobre el VIH basada en aptitudes para la vida y que la impartieron en el último año		
	Primaria	Secundaria	Global	Primaria	Secundaria	Global
América Latina						
Belice			80.0			
Brasil	41.4					25.8
Guatemala			7.0			
Honduras				16.7	18.4	15.4
México						75.1
Países de ingresos altos						
Bahamas	44.0	41.0	42.5			
(N = 44)		(N = 30)			(N = 21)	

*Los datos del informe son de 2005, pero la recopilación de datos puede variar entre 2000 y 2005
(-) = Sometido a revisión en el momento de imprimir el informe.

EG-4: Control del VIH en el lugar de trabajo				
País	2003	2005		
	Informe de país del UNGASS, 2003 [*]	Informe de país del UNGASS, 2005 ^{**}		
	Porcentaje de grandes empresas públicas y privadas que han adoptado políticas integrales sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo	Porcentaje de grandes empresas/compañías que han adoptado políticas integrales sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo		
		Públicas	Privadas	Todas
África subsahariana				
Angola		-	-	-
Botswana	70.0			
Burundi		-	-	-
Camerún		35.7	5.0	17.6
Cabo Verde	0.0			
Rep. Centroafricana		-	-	-
Comoras	0.0			
Congo		3.0	70.0	28.3
Congo, Rep. D. del		0.0	9.1	4.8
Côte d'Ivoire	48.0	-	-	-
Etiopía	92.5	33.3	33.3	33.3
Gabón		0.0	16.0	13.3
Ghana	100.0	0.0	12.0	10.0
Guinea		60.0	24.0	30.0
Kenya	70.0	-	-	-
Lesotho		0.0	0.0	0.0
Malawi	17.5			47.0
Mali		0.2	0.2	0.2
Mauricio	40.0			
Mozambique		0.0	6.3	3.2
Namibia	49.5			
Nigeria	53.0			46.9
Rwanda	6.0			
Seychelles	50.0			
Sudáfrica	77.0			
Swazilandia	100.0			47.7
Uganda	20.0			
Zambia				80.0
Zimbabwe	80.0			
Asia meridional y sudoriental				
Lao, Rep. D. Popular	97.2			
Malasia				
Filipinas	13.0			
Tailandia		-	-	-
Viet Nam	87.5			
Europa oriental y Asia central				
Ucrania		0.0	0.0	0.0
Caribe				
Jamaica	5.0			
Saint Kitts y Nevis		-	-	-
San Vicente y las Granadinas				14.3
Trinidad y Tabago				11.9
América Latina				
Honduras	0.5			
Suriname	24.0			
(N = 41)	(N = 23)	(N = 24)		

^{*}Los datos del informe son de 2003, pero la recopilación de datos puede variar entre 2001 y 2003

^{**}Los datos del informe son de 2005, pero la recopilación de datos puede variar entre 2003 y 2005

(-) = Sometido a revisión en el momento de imprimir el informe

EG-5: Infecciones de transmisión sexual—Manejo integral de casos				
País	2003	2005		
	Informe de país del UNGASS, 2003	Informe de país del UNGASS, 2005 ^a		
	Porcentaje de pacientes con infecciones de transmisión sexual que recibieron un diagnóstico (D), asesoramiento (A) y tratamiento (T) apropiados	Porcentaje de mujeres y varones con infecciones de transmisión sexual en establecimientos de salud que recibieron un diagnóstico, asesoramiento y tratamiento apropiados		
		Varones	Mujeres	Todos
África subsahariana				
Benin				100.0
Botswana	30.0 ¹			
Burkina Faso	4.0 (D+T) 13.0 (A)			
Guinea-Bissau		-	-	-
Kenya	50.0			
Madagascar	20.0 (D+T) 44.0 (A)			
Mauricio	100.0			
Nigeria		46.0 ²	41.0 ²	
Rwanda		36.6 ³	26.6 ³	28.3 ³
Seychelles	37.0			
Togo		97.9	91.8	92.4
Uganda	21.0			40.0 ⁴
Zambia				10.0
Zimbabwe	57.0			
Asia oriental y Pacífico				
Mongolia	100.0 ⁶			
Samoa	100.0 ⁷			
Asia meridional y sudoriental				
Camboya	88.0 ⁸			
Tailandia		69.2 ⁴	71.5 ⁴	70.2 ⁴
Viet Nam	38.0			
Europa oriental y Asia central				
Belarus	75.0			
Kazajstán	98.0			
Kirguistán	82.0			
Eslovaquia	100.0 ⁹			
Tayikistán	76.0			
Ucrania		38.6	44.4	41.4
África del Norte y Oriente Medio				
Djibouti	16.0 ¹⁰			
Marruecos	49.0			
Caribe				
Antigua y Barbuda				100.0
Trinidad y Tabago		-	-	-
América Latina				
Honduras		80.0	80.2	80.2
Países de ingresos altos				
Guam	100.0 (D), 34.0 (T), 18.0 (A) ⁵			
(N = 31)	(N = 20)		(N = 12)	

^a Los datos del informe son de 2005, pero la recopilación de datos puede variar entre 2000 y 2005

(-) = Sometido a revisión en el momento de imprimir el informe

¹ Datos de 1998

² Datos de 2003

³ Datos de 2000

⁴ Datos de 2004

⁵ Encuestas en dispensarios públicos y privados, 2002

⁶ Informe anual del Centro Nacional de Enfermedades Transmisibles, 2002

⁷ Ministerio de Salud, 2002 (todos fueron tratados y asesorados, pero el diagnóstico no se hizo en laboratorio)

⁸ OMS, 2002

⁹ Programa Nacional de Lucha contra el SIDA, 2002

¹⁰ Ministerio de Salud, 2002

EG-6: Prevención de las transmisión maternoinfantil—Profilaxis antirretrovírica

País	2003		2005*	
	Informe de país del UNGASS, 2003 [†]	Encuesta de cobertura ^{‡*}	Informe de país del UNGASS, 2005 [†]	Encuesta de cobertura ^{††}
	Porcentaje de mujeres embarazadas infectadas por el VIH que recibieron un ciclo terapéutico completo de profilaxis antirretrovírica para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil	Porcentaje de mujeres embarazadas VIH-positivas que recibieron profilaxis antirretrovírica	Porcentaje de mujeres embarazadas infectadas por el VIH que recibieron un ciclo terapéutico completo de profilaxis antirretrovírica para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil	Porcentaje de mujeres embarazadas VIH-positivas que recibieron profilaxis antirretrovírica
África subsahariana				
Angola		0.0	2.3	
Benin	0,0 ¹	94.0	18.0	38.0
Botswana	34.0	18.8		
Burkina Faso	<1,0	0.1		1.1
Burundi		1.2	13.2	2.4
Camerún		6.9		4.2
República Centroafricana			16,4 ¹⁰	
Chad	0,0 ¹		-	0.2
Congo		13.3	98.6	
Congo, República Democrática del	0,0 ¹	0.6		
Côte d'Ivoire		1.5	4.4	4.3
Eritrea		0.9		
Etiopia	<1,0	0.2	3.0	0.3
Gabón			10.7	0.7
Gambia		2.8		16.6
Ghana		1.3	0.5	1.3
Guinea		0.0		0.4
Guinea-Bissau			19.5	
Kenya	1.0	3.4	9.3	27.0
Lesotho			5,3 ¹⁰	5.1
Madagascar			0,0 ¹⁰	0.0
Malawi	<1,0	1.7	2,3 ¹⁰	
Mali		0.5	0.7	0.8
Mauritania				
Mauricio	100.0	40.4		
Mozambique		1.3	4.9	3.4
Namibia	7,0	1.3	25.0	17.4
Niger	0,0 ¹			
Nigeria	<1,0	0.1		0.2
Rwanda		13.8	9.4	
Senegal		0.4		1.4
Seychelles	100,0		97,7 ¹⁰	
Sierra Leona	0.0			
Somalia			3.3	
Sudáfrica	<1,0 ¹	8.9	78.7	14.6
Swazilandia		1.7	16.2	11.9
Tanzania, República Unida de	0.0	0.3		
Togo		0.3	32.8	1.8
Uganda	4,6	6.6	12.0	25.9
Zambia		6.3	25.0	4.0
Zimbabwe		4.1	6,6 ¹⁰	4.4

EG-6: Prevención de la transmisión maternoinfantil—Profilaxis antirretrovírica				
País	2003		2005*	
	Informe de país del UNGASS, 2003 [†]	Encuesta de cobertura ^{‡§}	Informe de país del UNGASS, 2005 [†]	Encuesta de cobertura ^{‡†}
	Porcentaje de mujeres embarazadas infectadas por el VIH que recibieron un ciclo terapéutico completo de profilaxis antirretrovírica para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil	Porcentaje de mujeres embarazadas VIH-positivas que recibieron profilaxis antirretrovírica	Porcentaje de mujeres embarazadas infectadas por el VIH que recibieron un ciclo terapéutico completo de profilaxis antirretrovírica para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil	Porcentaje de mujeres embarazadas VIH-positivas que recibieron profilaxis antirretrovírica
Asia oriental y Pacífico				
China		0.4		1.3
Mongolia	0.0			
Samoa	0,0 ⁴			
Oceanía				
Fiji			25,0 ¹⁰	
Asia meridional y sudoriental				
Afganistán	0,0 ²			
Bhután		25.7		
Camboya	2,7 ³	0.3	5.0	1.4
India	<1,0	0.0		1.6
Indonesia		0.5		0.7
Irán, República Islámica del		25.7		
Lao, República Democrática Popular		0.0		2.5
Malasia	0,0 ¹	6.2		6.1
Myanmar	2,0			
Nepal	2,1 ¹	0.7		0.9
Filipinas		0.5		0.4
Tailandia		33.3	83,4 ¹⁰	30.6
Viet Nam	2.3	1.7		
Europa oriental y Asia central				
Armenia	3.0			
Belarús	87,5	9.4		
Kazajistán	4,5	2.2		9.0
Kirguistán	0,0 ⁸			
Letonia		9.2		58.6
Moldova, República de	0,0 ⁹	3.5		
Rumania			0,2 ¹¹	
Federación de Rusia	12.0			14.6
Tayikistán	0,0			
Ucrania	49,6 ⁴	21.3	86,7 ¹⁰	31.8
África del Norte y Oriente Medio				
Egipto				7.3
Marruecos	1,0 ¹	1.5		
Omán		0.0		
Sudán				0.0
Caribe				
Antigua y Barbuda			50.2	
Barbados	0,0 ¹	38.7	90,0 ¹⁰	
Cuba	2,5 ⁵	19.8		
Dominica			100.0	
República Dominicana	0,0 ¹	14.2		15.7
Haití	0,0 ¹	1.6		
Jamaica				

EG-6: Prevención de las transmisión maternoinfantil—Profilaxis antirretrovírica

País	2003		2005	
	Informe de país del UNGASS, 2003 [†]	Encuesta de cobertura ^{†*}	Informe de país del UNGASS, 2005 [†]	Encuesta de cobertura ^{††}
	Porcentaje de mujeres embarazadas infectadas por el VIH que recibieron un ciclo terapéutico completo de profilaxis antirretrovírica para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil	Porcentaje de mujeres embarazadas VIH-positivas que recibieron profilaxis antirretrovírica	Porcentaje de mujeres embarazadas infectadas por el VIH que recibieron un ciclo terapéutico completo de profilaxis antirretrovírica para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil	Porcentaje de mujeres embarazadas VIH-positivas que recibieron profilaxis antirretrovírica
Santa Lucía			20.0	
San Vicente y las Granadinas			61.6	
Trinidad y Tabago	0,0 ¹	35.6	71,4 ¹⁰	
América Latina				
Argentina	55,0	11,8	87,0	0.0
Belice	70,0	19,0	73.3	
Brasil	33.6	26,2	57,6 ¹⁰	16
Chile		10,8		
Colombia				1.8
Ecuador				8.3
El Salvador		21,1		20.8
Guatemala	10,0	3,7		
Guyana	<1,0	14,5		17.6
Honduras		1,9	3.4	
México		3,5		2.1
Nicaragua		1,1		
Panamá	0,0 ¹	7,5		0,0
Paraguay	40,0 ¹		2.1	
Perú	14,8 ³	9,6		3.5
Uruguay	97,8 ³	56,9	19.3	
Venezuela	0,0 ⁶			4.2
Países de ingresos altos				
Chipre	100,0 ⁷			
Alemania			80,0	
Guam	0,0 ³			
Qatar	0,0 ⁴			
(N = 103)	(N = 53)	(N = 67)	(N = 45)	(N = 51)

[†]La fecha del informe es 2003, pero la recopilación de datos puede variar entre 2002 y 2003

^{††}Las estimaciones de los datos corresponden a 2003 y se basan en la información más reciente disponible

¹Los datos del informe son de 2005, pero la recopilación de datos puede variar entre 2002 y 2003

^{††}Las estimaciones de los datos corresponden a 2005 y se basan en la información más reciente disponible

(-) = En proceso de revisión en el momento de imprimir el informe

¹OMS, 2002

²Oficina de país de la OMS

³Programa Nacional de Lucha contra el SIDA, 2002

⁴Ministerio de Salud, 2002

⁵Meta nacional, 2002

⁶Informe mundial sobre el VIH/SIDA, 2002

⁷Departamento de Servicios Médicos y de Salud

⁸EURO Survey, 2002

⁹Programa Nacional de Lucha contra el SIDA, 2003

¹⁰Datos de 2004

¹¹Datos de 2003

EG-7: Tratamiento del VIH—Terapia antirretrovírica de combinación					
País	2003	2005			
	Informe de país del UNGASS, 2003 ^a	Informe de país del UNGASS, 2003 ^{a,c}	“Tres millones para 2005”, diciembre 2005		Encuesta de cobertura, 2005 [†]
		Porcentaje de personas con infección por el VIH avanzada que recibían terapia antirretrovírica de combinación	Cobertura estimada de ART, diciembre de 2005		Cobertura estimada
		Todos	Varones	Mujeres	
África subsahariana					
Angola	<1.0 ¹				6.0
Benin	2.5 ²				33.0
Botswana	7.9				85.0
Burkina Faso	1.4				24.0
Burundi	1.9 ²				14.0
Camerún	1.5 ³	17.8			22.0
República Centroafricana	<1.0 ³	4.2	4.4	4.0	3.0
Chad		-	-	-	17.0
Congo					17.0
Congo, Rep. Democrática del	0.0 ²	2.7			4.0
Côte d'Ivoire	2.7	22.1	19.3	24.6	17.0
Djibouti	1.8 ⁸				16.0
Guinea Ecuatorial	6.8 ¹				0.0
Eritrea	<1.0 ¹				5.0
Etiopía	<1.0 ¹	7.1	8.2	6.2	7.0
Gabón		-	-	-	23.0
Gambia	6.3 ¹				10.0
Ghana	1.8 ¹	5.0	5.6	4.6	7.0
Guinea					9.0
Guinea-Bissau		-	-	-	1.0
Kenya	3.0	19.7			24.0
Lesotho	<1.0 ¹				14.0
Liberia					3.0
Madagascar		0.4			0.0
Malawi	1.8	17.7	14.9	19.7	20.0
Malí	2.5 ¹⁴	11.0	16.8	8.1	32.0
Mauritania					40.0
Mauricio	100.0				
Mozambique	0.0 ¹	7.4	7.4	7.4	9.0
Namibia	0.0 ¹	35.0			71.0
Níger					5.0
Nigeria	1.5	7.0			7.0
Rwanda	<1.0	-	-	-	39.0
Senegal	<1.0 ²				47.0
Seychelles	68.2		78.0 ¹⁷	87.0 ¹⁷	
Sierra Leona	0.0 ¹				2.0
Somalia		0.8	0.6	1.1	1.0
Sudáfrica	0.0 ¹				21.0
Swazilandia	1.7	44.4			31.0
Tanzania, Rep. Unida de	<1.0				7.0
Togo		-	-	-	27.0
Uganda	6.3	56.0			51.0
Zambia	0.0 ¹	20.0			27.0
Zimbabwe	0.0 ¹				8.0

EG-7: Tratamiento del VIH—Terapia antirretrovírica de combinación					
País	2003	2005			
	Informe de país del UNGASS, 2003*	Informe de país del UNGASS, 2003**	“Tres millones para 2005”, diciembre 2005		Encuesta de cobertura, 2005†
		Porcentaje de personas con infección por el VIH avanzada que recibían terapia antirretrovírica de combinación	Cobertura estimada de ART, diciembre de 2005		Cobertura estimada
		Todos	Varones	Mujeres	
Asia oriental y Pacífico					
China	5.0 ³				25.0
Micronesia, Estados Federados de		0.0	0.0	0.0	
Mongolia					0.0
Samoa	100.0 ¹³				
Tonga	0.0 ⁶				
Oceanía					
Fiji			100.0 ¹⁷	100.0 ¹⁷	
Papua Nueva Guinea	0.0 ¹				15.0
Palau		33.3	0.0	50.0	
Asia meridional y sudoriental					
Afganistán	0.0 ⁴				0.0
Bangladesh	0.0 ¹				1.0
Bhután					8.9
Camboya	3.0 ⁵	57.0			36.0
India	2.0				7.0
Indonesia	2.7 ¹				30.0
Irán, Rep. Islámica del	100.0 ¹	12.7			9.0
Lao, Rep. Democrática Popular					49.0
Malasia					27.0
Maldivas					0.0
Myanmar	<1.0				7.0
Nepal					1.0
Pakistán	2.2 ¹				2.0
Filipinas	3.5 ¹				5.0
Sri Lanka	2.0 ³				6.0
Tailandia	4.0 ⁶	39.2 ¹⁷			60.0
Viet Nam	1.0				12.0
Europa oriental y Asia central					
Armenia	0.0 ⁹				15.0
Azerbaiyán	0.0 ⁹				0.0
Belarús	<1.0				5.0
Bosnia y Herzegovina	10.0 ⁹				
Bulgaria	44.5 ⁹				
Croacia	98.7 ⁹				100.0
República Checa					
Estonia	32.0 ⁹				17.0
Georgia	8.0 ⁹	98.5	99.0	100.0	49.0
Hungría	97.0 ⁹				
Kazajistán	1.0				15.0
Kirguistán	0.0 ¹⁰				12.0
Letonia	51.0 ⁹				31.0
Lituania	55.0 ⁹				64.0
Moldova, República de	8.3 ¹				39.0
Polonia	92.9 ⁹				100.0
Rumania	64.4 ⁹				100.0
Federación de Rusia	83.3 ¹				5.0
Eslovaquia	95.0 ⁹				
Tayikistán	0.0				16.0

EG-7: Tratamiento del VIH—Terapia antirretrovírica de combinación					
País	2003	2005			
	Informe de país del UNGASS, 2003 ^a	Informe de país del UNGASS, 2003 ^{a,c}	“Tres millones para 2005”, diciembre 2005		Encuesta de cobertura, 2005 [†]
		Porcentaje de personas con infección por el VIH avanzada que recibían terapia antirretrovírica de combinación	Cobertura estimada de ART, diciembre de 2005		Cobertura estimada
		Todos	Varones	Mujeres	
Turkmenistán					0.0
Ucrania	<1.0 ^b	33.5	29.1	41.0	7.0
Uzbekistán	0.0 ^b				7.3
					0.0
África del Norte y Oriente Medio					
Argelia					39.0
Egipto					12.0
Iraq					7.5
Jordania	21.3				45.0
Líbano	100.0 ^b				36.0
Jamahiriya Árabe Libia					35.0
Marruecos	20.7				48.0
Omán					100.0
Sudán	<1.0 ¹				1.0
República Árabe Siria					9.0
Túnez					34.0
Turquía		26.0 ¹⁷	23.5 ¹⁷		9.0
Yemen					0.0
Europa occidental					
Albania	0.0 ⁹				100.0
Macedonia	20.0 ⁹				
Serbia y Montenegro	26.4 ⁹				
Eslovenia	96.3 ⁹				
Caribe					
Antigua y Barbuda		60.0			
Barbados					95.0
Cuba					100.0
Dominica		36.7			
República Dominicana	0.0 ³				17.0
Haití					20.0
Jamaica	<1.0 ²				56.0
San Lucía		80.6			
San Vicente y las Granadinas		100.0			
Trinidad y Tabago	<1.0 ²	97.0			38.0
América Latina					
Argentina	91.2	100.0			81.0
Belice	7.7				31.0
Bolivia	<1.0 ¹				37.0
Brasil	100.0				83.0
Chile					75.0
Colombia					44.0
Costa Rica					80.0
Ecuador					42.0
El Salvador					59.0
Guatemala	46.0				43.0
Guyana	0.0 ¹				50.0
Honduras	<1.0 ¹	36.5	26.0	53.7	35.0
México	92.0				71.0
Nicaragua	0.0 ¹				16.0
Panamá					97.0

EG-7: Tratamiento del VIH - Terapia antirretrovírica de combinación					
País	2003	2005			
	Informe de país del UNGASS, 2003*	Informe de país del UNGASS, 2003**	“Tres millones para 2005”, diciembre 2005		Encuesta de cobertura, 2005†
		Porcentaje de personas con infección por el VIH avanzada que recibían terapia antirretrovírica de combinación	Cobertura estimada de ART, diciembre de 2005		Cobertura estimada
		Todos	Varones	Mujeres	
Paraguay	50.0				54.7
Perú	19.2 ⁷				76.1
Suriname					55.0
Uruguay	50.5 ⁷				69.0
Venezuela					84.0
Países de ingresos altos					
Australia	53.2 ¹⁶				
Austria	92.6 ⁹				
Bahamas	<1.0 ¹				
Bélgica	93.8 ⁹				
Chipre	100.0 ¹¹				
Dinamarca	90.9 ⁹				
Finlandia	94.6 ⁹				
Alemania	94.7 ⁹				
Hong-Kong	100.0 ¹				
Islandia	87.5 ⁹				
Italia	72.7 ⁹				
Corea, Rep. Democrática Popular de				0.0	
Luxemburgo	96.9 ⁹				
Malta	94.3 ⁹				
Países Bajos	96.0 ⁹				
Noruega	89.6 ⁹				
Qatar	64.9 ¹²				
Arabia Saudita				14.0	
Singapur	0.0 ¹⁵				
España	92.3 ⁹				
Suecia	95.0 ⁹				
Suiza	95.0 ⁹				
Reino Unido	92.1 ⁹				
Estados Unidos		70.1 ¹⁸			
(N = 163)	(N = 114)	(N = 41)	(N = 118)	(N = 61)	

*Los datos del informe son de 2003, pero la recopilación de datos puede variar entre 2002 y 2003

**Los datos del informe son de 2005, pero la recopilación de datos puede variar entre 2003 y 2005

†Los datos son estimaciones relativas a 2005 basadas en la información más reciente disponible

(-) = Sometido a revisión en el momento de imprimir el informe

¹OMS, 2002

²Iniciativa para la Aceleración del Acceso, 2002

³Meta nacional, 2002

⁴Oficina de país de la OMS

⁵Centro Nacional del VIH/SIDA, Dermatología e ITS, 2002

⁶Programa Nacional de Lucha contra el SIDA, 2003

⁷Programa Nacional de Lucha contra el SIDA, 2002

⁸Ministerio de Salud y OMS, 2002

⁹EURO Survey of ARV access, OMS 2003

¹⁰EURO Survey, 2002

¹¹Departamento de Servicios Médicos y de Salud

¹²Registro del VIH, 2002

¹³Ministerio de Salud, 2002

¹⁴OMS, 2003

¹⁵Ministerio de Salud

¹⁶Informe anual de vigilancia

¹⁷Dato de 2004

¹⁸Dato de 2003

EG-8: Apoyo a los niños afectados por el VIH/SIDA							
País	2005						
	Informe de país del UNGASS, 2005*						
	Porcentaje de huérfanos y niños vulnerables cuyos hogares recibieron apoyo externo básico para atender a los niños						
	Zona rural			Zona urbana			Todas
	Varones	Mujeres	Todos	Varones	Mujeres	Todos	Todos
África subsahariana							
Congo	-	-	-	-	-	-	-
Etiopía	2.9	2.8	2.9	7.1	5.8	6.4	3.6
Kenya	6.6	6.4	6.5	10.3	18.1	14.0	10.3
Lesotho							25.0
Madagascar							7.4
Mali	-	-	-	-	-	-	-
Togo							9.7
Zambia							13.4
(N = 8)				(N = 8)			

* Los datos del informe son de 2005, pero la recopilación de datos puede variar entre 2003 y 2005

(-) = Sometido a revisión en el momento de imprimir el informe

EG-9: Seguridad sanguínea		
País	2001	2005
	Encuesta de cobertura *	Informe de país del UNGASS, 2005 **
	Sangre donada analizada para detectar el VIH	Porcentaje de unidades de sangre transfundida analizadas para detectar el VIH
África subsahariana		
Angola	100.0	
Benin	100.0	100.0
Botswana	100.0	
Burkina Faso	85.0	
Burundi	100.0	100.0
República Centroafricana	80.0	
Chad	90.0	-
Congo	80.0	100.0
Congo, Rep. Democrática del	70.0	
Côte d'Ivoire	100.0	100.0
Etiopía	100.0	100.0
Eritrea	100.0	
Gabón		72.5
Gambia	100.0	
Ghana	100.0	
Guinea	100.0	
Guinea-Bissau		100.0
Kenya	98.0	100.0
Lesotho		100.0
Liberia	80.0	
Madagascar	100.0	99.4
Malawi		100.0
Malí	100.0	100.0
Mauritania	80.0	
Mauricio	100.0	
Mozambique	100.0	100.0
Namibia	100.0	100.0
Níger	100.0	
Nigeria		100.0
Rwanda	100.0	
Senegal	100.0	
Seychelles	100.0	
Sierra Leona	20.0	
Sudáfrica	100.0	100.0
Swazilandia	100.0	100.0
Tanzania, República Unida de	100.0	
Togo	100.0	79.0
Uganda	100.0	100.0
Zambia	100.0	100.0
Zimbabwe	100.0	100.0
Asia oriental y Pacífico		
China	100.0	
Oceanía		
Fiji		100.0
Micronesia, Estados Federados de		100.0
Palau		100.0
Papua Nueva Guinea	0.0	
Asia meridional y sudoriental		
Bangladesh	10.0	
Bhután	10.0	
Camboya	100.0	100.0
India	100.0	

EG-9: Seguridad sanguínea		
País	2001	2005
	Encuesta de cobertura*	Informe de país del UNGASS, 2005**
	Sangre donada analizada para detectar el VIH	Porcentaje de unidades de sangre transfundida analizadas para detectar el VIH
Indonesia	100.0	
Irán, República Islámica del		100.0
Malasia	100.0	
Myanmar	35.0	
Nepal	99.0	
Pakistán	95.0	
Sri Lanka	100.0	100.0
Tailandia	100.0	100.0
Viet Nam	100.0	
Europa oriental y Asia central		
Belarus	100.0	
Croacia	100.0	
Letonia	100.0	
Moldova, República de	100.0	
Rumania	100.0	
Federación de Rusia	100.0	
Ucrania	100.0	100.0
Uzbekistán	100.0	
África del Norte y Oriente Medio		
Argelia		98.9
Marruecos	100.0	
Túnez	100.0	
Caribe		
Antigua y Barbuda		100.0
Bahamas	100.0	
Barbados	100.0	
Cuba	100.0	
Dominica		92.8
República Dominicana	100.0	
Santa Lucía		96.0
San Vicente y las Granadinas		99.7
Trinidad y Tabago	0.0	100.0
América Latina		
Argentina	96.0	100.0
Belize	100.0	96.8
Bolivia	35.0	
Brasil	100.0	
Chile	100.0	
Colombia	100.0	
Costa Rica	100.0	
Ecuador	100.0	
El Salvador	100.0	
Guatemala	100.0	
Guyana	100.0	
Honduras	100.0	
Jamaica	100.0	
México	100.0	
Nicaragua	100.0	
Panamá	100.0	
Paraguay	98.0	
Perú	0.0	100.0
Suriname	100.0	

EG-9: Seguridad sanguínea		
País	2001	2005
	Encuesta de cobertura [*]	Informe de país del UNGASS, 2005 ^{**}
	Sangre donada analizada para detectar el VIH	Porcentaje de unidades de sangre transfundida analizadas para detectar el VIH
Uruguay	100.0	
Venezuela	100.0	
Países de ingresos altos		
Bahamas	100.0	
Estados Unidos		100.0
(N = 100)	(N = 85)	(N = 40)

^{*}Los datos son estimaciones relativas a 2001 basadas en la información más reciente disponible

^{**}Los datos del informe son de 2005, pero la recopilación de datos puede variar entre 2004 y 2005

(-) = Sometido a revisión en el momento de imprimir el informe

EG-10: Jóvenes—Conocimiento sobre prevención del VIH														
País	2003			2005										
	Informe de país del UNGASS, 2003			Informe de país del UNGASS, 2005*									Encuestas Demográficas y de Salud** (salvo que se especifique lo contrario)	
	Porcentaje de mujeres jóvenes (15–24 años) con conocimientos exhaustivos sobre el VIH/SIDA			Porcentaje de mujeres y varones jóvenes (15–24 años) con conocimientos exhaustivos sobre el VIH/SIDA									Porcentaje de mujeres y varones jóvenes (15–24 años) con conocimientos exhaustivos sobre el VIH/SIDA	
	Mujeres			Varones			Mujeres			Todos			Varones	Mujeres
	Zona urbana	Zona rural	Todas	Zona urbana	Zona rural	Todas	Zona urbana	Zona rural	Todas	Zona urbana	Zona rural	Todas		
África subsahariana														
Angola				56.7	10.0	42.7	46.3	10.5	35.2	51.5	10.3	39.0		
Benin				7.9	13.1	10.6	3.4	11.8	8.1	5.7	12.4	9.3	14.0	8.0
Botswana	25.2	29.8	27.9										33.0†	40.0†
Burkina Faso													23.0	15.0
Burundi	40.0	21.0	24.0	0.6	3.9	3.6	0.3	3.8	3.6	0.4	3.9	3.6		
Camerún	24.0	7.0	16.0	40.6	24.8	34.3	36.5	14.5	27.2	37.8	17.5	30.8	34.0	27.0
República Centrafricana	1.5	8.7	5.1											
Chad	2.3	12.2	5.0										21.0	8.0
Comoras	9.8	10.4	9.9											
Congo				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Côte d'Ivoire	19.0	6.0	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Guinea Ecuatorial	1.1	6.1	3.8											
Eritrea														37.0
Etiopía				56.7	25.1		44.4	14.0						
Gambia	20.0	11.0	15.0											
Ghana				54.4	28.8	40.3	43.8	29.3	35.8	48.2	29.0	38.0	44.0	38.0
Guinea-Bissau	16.0	2.0	8.0											
Kenya	35.0	22.0	26.0	77.8	80.0	79.5	61.5	57.1	58.3	68.2	66.7	68.9	47.0	34.0
Lesotho	27.0	16.0	18.0											
Madagascar						15.7			19.4				16.0	19.0
Malawi	44.0	31.0	34.0	43.3	34.4	36.0	30.9	22.0	23.5	33.7	24.3	29.8		
Mali				-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0	9.0
Mozambique													33.0	20.0
Níger	17.0	2.0	5.0											
Nigeria				33.6	19.8		30.5	14.8					21.0	18.0
Rwanda	40.0	23.0	23.0											
Santo Tomé y Príncipe	13.0	7.0	11.0											
Sierra Leona	22.0	10.0	16.0											
Somalia				13.6	11.9	12.5	9.6	7.0	7.9	11.5	9.4	10.2		
Sudáfrica	26.0	13.0	20.0											
Swazilandia	26.1	28.4	26.9											
Tanzania, República Unida de	42.0	22.0	26.0										49.0†	44.0†
Togo	21.0	13.0	20.0											
Uganda	48.0	23.0	28.0											
Zambia	32.0	20.9	25.6			46.1			40.5				33.0	31.0
Zimbabwe				57.7	55.5	56.3	57.8	51.4	54.1	57.7	53.4	55.2		

EG-10: Jóvenes—Conocimiento sobre prevención del VIH														
País	2003			2005										
	Informe de país del UNGASS, 2003			Informe de país del UNGASS, 2005*									Encuestas Demográficas y de Salud** (salvo que se especifique lo contrario)	
	Porcentaje de mujeres jóvenes (15–24 años) con conocimientos exhaustivos sobre el VIH/SIDA			Porcentaje de mujeres y varones jóvenes (15–24 años) con conocimientos exhaustivos sobre el VIH/SIDA									Porcentaje de mujeres y varones jóvenes (15–24 años) con conocimientos exhaustivos sobre el VIH/SIDA	
	Mujeres			Varones			Mujeres			Todos			Varones	Mujeres
	Zona urbana	Zona rural	Todas	Zona urbana	Zona rural	Todas	Zona urbana	Zona rural	Todas	Zona urbana	Zona rural	Todas		
Asia oriental y Pacífico														
Mongolia	28.1	36.9	32.1	4.1	2.2	3.0	5.5	4.6	5.0	4.8	3.4	4.0		
Asia meridional y Sudoriental														
Camboya	52.0	33.0	37.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Indonesia	4.2	10.2	6.8											
Tailandia				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Viet Nam	20.8	41.3	25.4										50.0†	42.0†
Europa oriental y Asia central														
Azerbaiyán	0.8	3.2	2.1											
Moldova, República de	16.2	22.7	18.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Federación de Rusia												48.0		
Ucrania				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Uzbekistán	2.6	5.3	3.4										7.0	8.0
Europa occidental														
Albania	0.3	0.0	0.2											
África del N orte y Oriente Medio														
Marruecos														12.0
Caribe														
Barbados												1.0		
Cuba	40.2	56.2	51.8											
República Dominicana	33.0	23.0	33.0											
Haití	24.0	8.0	14.0											
Trinidad y Tabago			33.0											
América Latina														
Bolivia	9.3	29.2	21.6										18.0	
Brasil												58.4		
Guyana	35.2	36.4	35.6											
Suriname	21.0	36.8	26.5											
(N = 57)	(N = 38)			(N = 24)									(N = 18)	

*Los datos del informe son de 2005, pero la recopilación de datos puede variar entre 2003 y 2005

**Los datos de 2005 se basan en los datos recopilados de 2001 a 2005

†Fuente: Encuesta sobre indicadores del SIDA

(-) = Sometido a revisión en el momento de imprimir el informe

EG-11: Relaciones sexuales antes de los 15 años de edad										
País	2005									
	Informe de país del UNGASS, 2005*							Encuestas Demográficas y de Salud** (salvo que se especifique lo contrario)		
	Porcentaje de jóvenes de 15–24 años de edad que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años							Porcentaje de jóvenes de 15–24 años de edad que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años		
	Varones			Mujeres			Todos	Mujeres	Varones	
	Zona urbana	Zona rural	Todas	Zona urbana	Zona rural	Todas	Todas			
África subsahariana										
Angola	40.9	60.0	46.7	21.7	30.0	24.3	35.5			
Benin	15.7	15.7	15.7	9.9	7.5	8.5	12.1	16.0	23.8	
Burkina Faso								7.3	4.7	
Burundi	14.3	14.0	14.0	2.5	5.7	5.5	9.7			
Camerún	23.4	22.3	23.0	28.8	42.5	34.6	28.8	18.0	11.5	
República Centroafricana	8.2	10.7	9.6	12.3	8.1	9.9	9.8			
Chad	-	-	-	-	-	-	-	19.0	11.0	
Congo	10.0	10.4	10.1	10.0	9.9	9.9	10.0			
Côte d'Ivoire			13.3			14.5	14.1			
Eritrea								8.8		
Etiopía	47.1	38.5	40.3	49.7	39.5	41.5	40.9			
Gabón	35.1			18.6						
Ghana								7.4	3.9	
Guinea	16.5	15.0	15.7	23.0	14.4	17.6	16.6			
Kenya	23.7	19.5	20.4	19.6	16.2	17.1	18.7	14.5	30.9	
Lesotho	27.9	27.3	27.5	9.5	16.2	14.4	20.9			
Madagascar			22.3			31.0		16.0	7.7	
Mali								26.0	10.6	
Mauritania								13.2	2.1	
Mozambique								27.7		
Nigeria			4.9			14.7		20.3	7.9	
Tanzania, República Unida de								10.1 ¹	10.7 ¹	
Uganda								12.2 ¹	16.3 ¹	
Zambia								17.5		
Zimbabwe	6.3	9.7	8.5	5.8	9.8	8.1	8.3			
Asia oriental y Pacífico										
Mongolia	5.7	1.1	3.0	0.3	0.0	0.1	1.6			
Asia meridional y sudorienta										
Camboya	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1			
Nepal								9.0	20.0	
Tailandia			10.9			6.6	8.7			
Viet Nam								0.5 ¹	0.3 ¹	
Europa oriental y Asia central										
Azerbaián								1.0 ²		
Moldova, República de	45.8	26.6	34.1	30.9	19.0	23.5	28.8			
Federación de Rusia			17.2			8.2	13.3			
Caribe										
Barbados			35.9			25.6	31.0			
República Dominicana								13.0	18.0	
Honduras								13.0 ²	19.0 ²	
San Vicente y las Granadinas			63.0			37.0				

EG-11: Relaciones sexuales antes de los 15 años de edad										
País	2005									
	Informe de país del UNGASS, 2005*							Encuestas Demográficas y de Salud** (salvo que se especifique lo contrario)		
	Porcentaje de jóvenes de 15–24 años de edad que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años							Porcentaje de jóvenes de 15–24 años de edad que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años		
	Varones			Mujeres			Todos	Mujeres	Varones	
	Zona urbana	Zona rural	Todas	Zona urbana	Zona rural	Todas	Todas			
América Latina										
Argentina							22.6			
Bolivia								6.0	15.0	
Ecuador								7.0 ²		
Guatemala								7.0 ²	15.0 ²	
Nicaragua								11.0		
(N = 42)			(N = 24)					(N = 24)		

*Los datos del informe son de 2005, pero la recopilación de datos puede variar entre 2003 y 2005

**Los datos de 2005 se basan en los datos recopilados de 2001 a 2005

(-) = Sometido a revisión en el momento de imprimir el informe

¹Fuente: Encuesta sobre indicadores del SIDA

²Fuente: Encuesta sobre salud reproductiva

EG-12: Relaciones sexuales peligrosas entre mujeres y varones jóvenes													
País	2003		2005										
	Informe de país del UNGASS, 2003*		Informe de país del UNGASS, 2005**									Encuestas Demográficas y de Salud† (salvo que se especifique lo contrario)	
	Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15–24 años de edad que en los últimos 12 meses tuvieron relaciones sexuales con una pareja no marital y con la que no convivían		Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15–24 años de edad que en los últimos 12 meses tuvieron relaciones sexuales con una pareja no marital y con la que no convivían									Porcentaje de encuestados de 15–24 años de edad que en los últimos 12 meses tuvieron relaciones sexuales con una pareja no marital y con la que no convivían, de todos los encuestados que comunicaron haber tenido actividad sexual en los últimos 12 meses	
			Zona urbana			Zona rural			Todas				
	Varones	Mujeres	Varon	Mujeres	Todo	Varon	Mujeres	Tod	Varones	Mujeres	Tod	Varones	Mujeres
África subsahariana													
Angola			61.5	35.6	49.2	61.1	26.3	43.2	61.4	32.7	47.1		
Benin			31.0	2.0	9.6	32.6	4.5	13.0	31.8	3.4	17.6	90.0	36.0
Burkina Faso	82.0	19.0										78.0	23.0
Camerún	86.0	41.0	95.2	57.2	68.6	82.0	27.3	40.1	89.9	44.7	67.3	91.0	44.0
República Centroafricana			42.1	9.4	22.9	40.2	13.7	27.1	41.0	11.9	26.5		
Chad			-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.0	7.0
Congo			72.0	63.5	67.6	72.0	65.4	68.6	72.0	64.7	68.4		
Côte d'Ivoire	91.0	51.0							57.9	64.3	61.0		
Etiopía	64.0	7.0	43.5	24.8	30.1	36.5	3.0	12.0	37.9	7.4	22.7		
Ghana												83.0	50.0
Guinea	92.0	23.0											
Kenya	92.0	39.0	13.5	9.8	11.5	16.1	8.2	12.2	15.5	8.6	12.1	84.0	30.0
Lesotho			96.4	57.6	67.4	87.6	38.0	52.5	89.5	43.3	66.4		
Madagascar									71.9	30.9		72.0	31.0
Malawi	71.0	17.0							62.1	13.9			
Mali			100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	16.0	17.0	16.5	85.0	18.0
Mozambique												84.0	37.0
Nigeria			90.5	42.9		73.0	27.7					78.0	29.0
Rwanda	42.0	10.0											
Tanzania, República Unida de	87.0	40.0										81.0	36.0
Togo	89.0	51.0											
Uganda	59.0	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.0	26.0
Zambia									24.0	13.0		86.0	30.0
Zimbabwe	82.0	20.0	75.0	21.3	40.2	80.7	24.8	47.6	78.6	23.3	51.0		
Asia oriental y Pacífico													
Mongolia			93.5	76.4	86.6	93.4	81.1	88.9	93.5	79.2	86.3		

EG-12: Relaciones sexuales peligrosas entre mujeres y varones jóvenes													
País	2003		2005										
	Informe de país del UNGASS, 2003*		Informe de país del UNGASS, 2005**									Encuestas Demográficas y de Salud† (salvo que se especifique lo contrario)	
	Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15-24 años de edad que en los últimos 12 meses tuvieron relaciones sexuales con una pareja no marital y con la que no convivían		Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15-24 años de edad que en los últimos 12 meses tuvieron relaciones sexuales con una pareja no marital y con la que no convivían									Porcentaje de encuestados de 15-24 años de edad que en los últimos 12 meses tuvieron relaciones sexuales con una pareja no marital y con la que no convivían, de todos los encuestados que comunicaron haber tenido actividad sexual en los últimos 12 meses	
			Zona urbana			Zona rural			Todas				
	Varones	Mujeres	Varon	Mujeres	Todo	Varon	Mujeres	Tod	Varones	Mujeres	Tod	Varones	Mujeres
Asia meridional y sudoriental													
Camboya			72.0	5.4	38.9	18.2	2.1	7.2	26.3	2.6	14.4		
India												12.0 ²	2.0 ²
Tailandia												56.0	
Viet Nam												21.0 ¹	0.7 ¹
Europa oriental y Asia central													
Uzbekistán												45.0 ³	1.0 ³
Caribe													
Barbados									26.6	15.9	21.6		
República Dominicana												83.0	29.0
América Latina													
Bolivia												70.0	32.0
Nicaragua													10.0
	(N = 34)	(N = 12)						(N = 21)					(N = 19)

*Los datos del informe son de 2003, pero la recopilación de datos puede variar entre 1998 y 2000

**Los datos del informe son de 2005, pero la recopilación de datos puede variar entre 2003 y 2005

†Los datos de 2005 se basan en los datos recopilados de 2001 a 2005

(-) = Sometido a revisión en el momento de imprimir el informe

¹Fuente: Encuesta sobre indicadores del SIDA

²Fuente: Encuesta sobre vigilancia del comportamiento

³Fuente: Encuesta sobre estado de salud

EG-13: Jóvenes—Uso del preservativo con parejas no habituales													
País	2003		2005										
	Informe de país del UNGASS, 2003 [*]		Informe de país del UNGASS, 2005 ^{**}									Encuestas Demográficas y de Salud [†] (salvo que se especifique lo contrario)	
	Porcentaje de jóvenes (15–24 años) que utilizaron un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja no habitual		Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años de edad que comunican haber utilizado un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja no habitual									Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años de edad que comunican haber utilizado un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja no habitual	
	Zona urbana			Zona rural			Todas						
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Todos	Varones	Mujeres	Todos	Varones	Mujeres	Todos	Varones	Mujeres
África subsahariana													
Angola			63.6	71.2	66.2	63.6	20.0	50.0	63.6	55.2	59.4		
Benin	34.0	19.0	53.3	25.0	49.1	65.1	71.4	66.7	59.5	50.8	55.2	34.0	19.0
Botswana	88.0	75.0										88.0 ¹	75.0 ¹
Burkina Faso	55.0	41.0										67.0	54.0
Burundi			50.0	7.1	20.0	55.7	48.7	51.1	55.2	46.0	50.6		
Camerún	31.0	16.0	65.7	53.6	58.6	39.9	27.2	33.3	55.4	42.5	49.0	57.0	46.0
República Centrafricana			84.1	79.4	83.0	82.5	46.7	72.7	83.2	60.6	71.9		
Chad			-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0	17.0
Congo, República Democrática del		12.0											
Côte d'Ivoire	56.0	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Etiopía	30.0	17.0	84.4	46.3	69.5	23.3	6.7	19.5	36.1	14.6	25.4		
Eritrea												81.0	
Gabón	48.0	33.0											
Ghana	33.0	20.0	55.5	38.5	45.9	44.7	27.1	35.9	49.6	32.2	40.9	52.0	33.0
Guinea	32.0	17.0										42.0	27.0
Kenya	43.0	14.0	58.4	32.5	45.9	42.6	22.6	33.2	46.1	25.2	35.6	47.0	25.0
Lesotho			72.0	65.6	67.9	42.0	44.0	43.0	48.6	49.8	49.2	48.0	50.0
Madagascar												12.0	5.0
Malawi	38.0	32.0	56.5	51.8	53.8	43.2	29.2	35.6	45.6	33.0	39.3	47.0	35.0
Mali	30.0	14.0										30.0	14.0
Mozambique												33.0	29.0
Nigeria	38.0	21.0	66.8	50.9		54.1	34.1					46.0	24.0
Rwanda	55.0	23.0										41.0	28.0
Senegal												54.0	34.0
Sudáfrica		20.0											
Tanzania, República Unida de	31.0	21.0										47.0 ²	42.0 ²
Togo	41.0	22.0											
Uganda	62.0	44.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.0 ²	53.0 ²
Zambia	38.0	38.0							38.4	26.1		40.0 ³	35.0 ³
Zimbabwe	69.0	42.0	69.2	52.1	63.2	49.1	35.7	45.0	56.5	42.6	49.6		
Asia oriental y Pacífico													
Monqolia			61.4	45.7	55.8	56.5	39.5	50.8	58.5	42.1	50.3		

EG-13: Jóvenes—Uso del preservativo con parejas no habituales													
País	2003		2005										
	Informe de país del UNGASS, 2003 [†]		Informe de país del UNGASS, 2005 ^{**}									Encuestas Demográficas y de Salud [†] (salvo que se especifique lo contrario)	
	Porcentaje de jóvenes (15–24 años) que utilizaron un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja no habitual		Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años de edad que comunican haber utilizado un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja no habitual									Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años de edad que comunican haber utilizado un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja no habitual	
	Varones	Mujeres	Zona urbana			Zona rural			Todas			Varones	Mujeres
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Todos	Varones	Mujeres	Todos	Varones	Mujeres	Todos	Varones	Mujeres
Asia meridional y sudoriental													
Camboya		43.0											
India	51.0	40.0										59.0 ⁴	51.0 ⁴
Nepal	52.0												
Tailandia			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Viet Nam												68.0 ²	
Europa oriental y Asia central													
República Checa									55.0	31.0			
Moldova, República de												63.0	44.0
Federación de Rusia											78.8		
Ucrania			73.5	67.0	71.8	72.2	60.0	69.2	73.2	65.1	69.1		
Uzbekistán												50.0 ⁵	
Caribe													
Barbados									77.8	33.3	49.3		
República Dominicana	48.0	12.0										52.0	29.0
Haití	30.0	19.0											
Jamaica		38.0											
América Latina													
Argentina											46.0		
Bolivia	22.0	8.0										37.0	20.0
Brasil	59.0	32.0									74.1		
Chile	33.0	18.0											
Colombia		29.0											
México	57.0	57.0											
Nicaragua													17.0
Paraguay		79.0											
Perú		19.0											
(N = 54)	(N = 34)					(N = 24)						(N = 27)	

[†]Los datos del informe son de 2003, pero la recopilación de datos puede variar entre 1996 y 2001

^{**}Los datos del informe son de 2005, pero la recopilación de datos puede variar entre 2000 y 2005

[†]Los datos de 2005 se basan en los datos recopilados de 2001 a 2005

(-) = Sometido a revisión en el momento de imprimir el informe

¹Fuente: Encuesta sobre impacto del SIDA

²Fuente: Encuesta sobre indicadores del SIDA

³Fuente: Encuesta sobre comportamiento sexual

⁴Fuente: Encuesta sobre vigilancia del comportamiento

⁵Fuente: Encuesta sobre estado de salud

EG-14: Huérfanos—Asistencia a la escuela					
País	2003			2005	
	Informe de país del UNGASS, 2003*			Informe de país del UNGASS, 2005**	Encuestas Demográficas y de Salud†
	Razón de asistencia escolar entre huérfanos y no huérfanos			Razón de asistencia escolar actual entre huérfanos y no huérfanos de 10–14 años	Razón de la proporción de huérfanos (ambos padres fallecidos) de 10–14 años de edad que asisten a la escuela frente a la proporción de no huérfanos de la misma edad (viven con por lo menos uno de los padres) que asisten a la escuela
	Varones	Mujeres	Todos	Todos	Todos
África subsahariana					
Angola			0.90		0.90 ¹
Botswana			0.99		0.99 ²
Burkina Faso					1.09
Burundi			0.70		0.70 ¹
Camerún		0.64	0.94		0.99
República Centroafricana			0.91	-	0.91 ²
Chad			0.96		1.07
Comoras			0.59		0.59 ¹
Congo, República Democrática del			0.72	-	0.72 ¹
Côte d'Ivoire			0.83		0.83 ¹
Guinea Ecuatorial			0.95		0.95 ¹
Eritrea					0.83
Etiopía	0.58	0.64	0.60	-	0.60
Gabón			0.98		0.98
Gambia			0.85		0.85 ¹
Ghana			0.93		0.79
Guinea	0.86	1.55	1.13		1.13
Guinea-Bissau			1.03		1.03 ¹
Kenya	0.79	0.71	0.74	0.97	0.95
Lesotho			0.87		0.87 ¹
Madagascar			0.65	0.80	0.76
Malawi	0.96	0.90	0.93	0.97	0.93
Mali			0.72		1.04
Mozambique	0.44	0.50	0.47		0.80
Namibia			0.92	0.97	0.92
Niger			1.07		
Nigeria	0.69	1.07	0.87		0.64
Rwanda	0.76	0.86	0.80		0.80 ¹
Senegal			0.74		0.74 ¹
Sierra Leona			0.71		0.71 ¹
Somalia			0.65		0.65 ¹
Sudáfrica	0.95	0.96	0.95		
Swazilandia			0.91		0.91 ¹
Tanzania, República Unida de	0.66		0.74		0.82 ³
Togo			0.96		0.96 ¹
Uganda	0.90	1.00	0.95		0.95
Zambia			0.87	0.17	0.92 ⁴
Zimbabwe	0.89	0.82	0.85		0.98 ²

EG-14: Huérfanos—Asistencia a la escuela				
País	2003			2005
	Informe de país del UNGASS, 2003 ^a			Encuestas Demográficas y de Salud [†] (Salvo que se especifique lo contrario)
	Razón de asistencia escolar entre huérfanos y no huérfanos			Razón de la proporción de huérfanos (ambos padres fallecidos) de 10–14 años de edad que asisten a la escuela frente a la proporción de no huérfanos de la misma edad (viven con por lo menos uno de los padres) que asisten a la escuela
	Varones	Mujeres	Todos	Todos
Asia meridional y sudoriental				
Camboya				0.71
Indonesia				0.82
África del Norte y Oriente Medio				
Sudán			0.96	0.96 ¹
Caribe				
República Dominicana				0.96
Haití				0.87
Santa Lucía				-
América Latina				
Guatemala				0.98
Perú				0.85
Suriname				0.89 ¹
(N = 47)	(N = 37)		(N = 9)	

^aLos datos del informe son de 2003, pero la recopilación de datos puede variar entre 1997 y 2001

^{a*}Los datos del informe son de 2005, pero la recopilación de datos puede variar entre 2001 y 2005

[†]Los datos de 2005 se basan en los datos recopilados de 1994 a 2004

(-) = Sometido a revisión en el momento de imprimir el informe

¹Fuente: Encuestas a base de indicadores múltiples

²Fuente: Censo

³Fuente: Encuesta sobre indicadores del SIDA

⁴Fuente: Encuesta sobre comportamiento sexual

EG-16: Tratamiento del VIH—Supervivencia después de 12 meses en tratamiento antirretrovírico									
País	2005								
	Informe de país del UNGASS, 2005								
	Varones			Mujeres			Todos		
	<15	15+	Todos	<15	15+	Todos	<15	15+	Todos
África subsahariana									
Chad	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Côte d'Ivoire	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Etiopía			90.2			86.4			88.6
Madagascar									100.0
Malawi									83.0
Namibia									91.0
Nigeria									98.2
Somalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Europa oriental y Asia central									
Georgia			85.0			100.0			88.0
Ucrania	100.0	67.6	68.9	100.0	73.7	75.4	100.0	70.3	71.9
Caribe									
Barbados			92.5			94.0			93.3
Dominica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Lucía									80.0
San Vicente y las Granadinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trinidad y Tabago	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N = 15)						(N = 15)			

(-) = Sometido a revisión en el momento de imprimir el informe

ECPB-3: Poblaciones más expuestas—Pruebas del VIH				
País	2005			
	Informe de país del UNGASS, 2005*			
	Porcentaje de poblaciones más expuestas que se sometieron a la prueba del VIH en los últimos 12 meses y conocen el resultado			
	Todos	Profesionales del sexo	Consumidores de drogas intravenosas	Varones que tienen relaciones sexuales con varones
África subsahariana				
Burundi		37.6		
Congo		3.3		8.3
Senegal				10.8
Asia oriental y Pacífico				
Mongolia		67		23.2
Asia meridional y sudoriental				
Bangladesh	1.3	1.6**	3.2	
India	28.9			
Indonesia		14.8	18.1	15.4
Irán, República Islámica del Irán			9.4	
Lao, República Democrática Popular		8.9		
Viet Nam		-	-	
Europa oriental y Asia central				
Armenia		33.2	21.1	42
Belarús		48.5	39.2	55.4
Georgia		24.4	6.4	27.1
Rumania		35.5	36	
Ucrania	17.9	32.4	27.1	24.6
Europa occidental				
Macedonia, Ex República Yugoslava de		66.7	31.8	7.4
Serbia y Montenegro				52.5 ^{††}
África del Norte y Oriente Medio				
Argelia			15.1	
Marruecos			12.5	
Turquía		26		
Caribe				
Jamaica		43.0 [†]		
América Latina				
Argentina		35.9		96.3
Panamá		76.5		44.8
(N = 23)			(N = 23)	

*Los datos del informe son de 2005, pero la recopilación de datos puede variar entre 2003 y 2005

**Profesionales sexuales femeninas

†Trabajadores sexuales comerciales

††Valor relativo a Serbia

(-) = Sometido a revisión en el momento de imprimir el informe

ECPB-4: Poblaciones más expuestas—Programas de prevención						
País	2005					
	Varones que tienen relaciones sexuales con varones (VSV)		Consumidores de drogas intravenosas (CDI)		Profesionales del sexo (PS)	
	Informe de país del UNGASS, 2005*	Encuesta de cobertura**	Informe de país del UNGASS, 2005*	Encuesta de cobertura**	Informe de país del UNGASS, 2005*	Encuesta de cobertura**
	Porcentaje de las poblaciones más expuestas atendidas por programas de prevención	Porcentaje de VSV atendidos por programas de extensión	Porcentaje de las poblaciones más expuestas atendidas por programas de prevención	Porcentaje de CDI atendidos por programas de extensión	Porcentaje de las poblaciones más expuestas atendidas por programas de prevención	Porcentaje de PS atendidos por programas de extensión
África subsahariana						
Benin						100.0 [±]
Burkina Faso					42.1	60.0
Burundi					77.7	
Chad						5.0
Congo	33.3				53.4	
Côte d'Ivoire				100.0 [±]		71.0
Ghana						50.0
Guinea				100.0 [±]		50.0
Kenya		2.0				17.0
Malí					45.3	
Mozambique				< 0.5		5.0
Níger						92.0
Senegal		100.0 [±]				100.0 [±]
Togo						30.0
Uganda						10.0
Zimbabue						40.0
Asia oriental y Pacífico						
China		8.0	45.0	8.0	25.0	38.0
Mongolia	68.1				58.0	
Asia meridional y sudoriental						
Bangladesh	77.0		82.0	7.0	71.6 [†]	
Camboya		17.0		97.0		60.0
India	45.0	45.0	47.8	48.0	52.4	52.0
Indonesia	1.3	10.0	15.0	89.0	37.3 [†]	50
Irán, República Islámica del			11.4			
Lao, República Democrática Popular					70.7	100.0 [±]
Malasia		10.0		4.0		
Nepal	5.4	36.0	8.6	<0.50	35.2 [†]	68.0
Pakistán	22.0	15.0	28.4	100.0 [±]	11.0 [†]	20.0
Filipinas		2.0		<0.50		7.0
Viet Nam			69.1		81.0	
Europa oriental y Asia central						
Armenia	0.7		25.1		28.9	
Belarús	7.1		16.4		8.8	
Croacia				20.0		
República Checa			60.0			
Georgia			25.0		75.6	
Kazajstán		1.0		8.0		31.0
Kirguistán	79.2		8.4		75.3	
Letonia		2.0	7.9	2.0		17.0
Moldova, República de		90.0	22.4	74.0	14.1 ^{††}	50.0
Rumania	3.1		9.3	43.0	3.6	
Federación de Rusia		1.0	4.9	9.0	15.6	
Ucrania		5.0	38.4	13.0	33.7	5.0

ECPB-4: Poblaciones más expuestas—Programas de prevención						
País	2005					
	Varones que tienen relaciones sexuales con varones (VSV)		Consumidores de drogas intravenosas (CDI)		Profesionales del sexo (PS)	
	Informe de país del UNGASS, 2005*	Encuesta de cobertura**	Informe de país del UNGASS, 2005*	Encuesta de cobertura**	Informe de país del UNGASS, 2005*	Encuesta de cobertura**
	Porcentaje de las poblaciones más expuestas atendidas por programas de prevención	Porcentaje de VSV atendidos por programas de extensión	Porcentaje de las poblaciones más expuestas atendidas por programas de prevención	Porcentaje de CDI atendidos por programas de extensión	Porcentaje de las poblaciones más expuestas atendidas por programas de prevención	Porcentaje de PS atendidos por programas de extensión
Europa occidental						
Albania				7.0		
África del Norte y Oriente Medio						
Argelia			15.0			
Egipto				100.0 [±]		
Túnez		5.0		2.0		20.0
Turquía					13.8	
Caribe						
República Dominicana		10.0		100.0 [±]		30.0
Jamaica					60.0	
América Latina						
Argentina		30.0		93.0		30.0
Colombia		30.0				75.0
Ecuador		5.0				50.0
El Salvador		17.0				60.0
Guatemala		10.0				75.0
Panamá	43.8				48.0	71.0
Paraguay		50.0				10.0
Perú	22.6					20.0
Venezuela		1.0				30.0
(N = 57)	(N = 13)	(N = 24)	(N = 19)	(N = 24)	(N = 24)	(N = 36)

*Los datos del informe son de 2003, pero la recopilación de datos puede variar entre 2003 y 2005

**Los datos son estimaciones de 2005 basadas en la información más reciente disponible

†Profesionales del sexo femeninas

††Trabajadores sexuales comerciales

±Sométido a revisión en el momento de imprimir el informe

ECPB-5: Poblaciones más expuestas—Conocimiento sobre prevención del VIH				
País	2005			
	Informe de país del UNGASS, 2005*			
	Porcentaje de poblaciones más expuestas que identifican correctamente los diferentes medios para prevenir la transmisión sexual del VIH y rechazan las principales ideas erróneas sobre la transmisión del VIH			
	Todos	Varones que tienen relaciones sexuales con varones	Consumidores de drogas intravenosas	Profesionales del sexo
África subsahariana				
Benin		42.2		
Burundi				4.3
Congo		3.3		66.7
Malí				90.1
Asia oriental y Pacífico				
China		37.3	36.0	23.5**
Asia meridional y sudoriental				
Bangladesh	28.2	13.5	14.0	23.3
Indonesia		43.3	6.7	23.8
Lao, República Democrática Popular				20.5
Nepal		27.3	49.9	16.9
Viet Nam			34.4	24.2
Europa oriental y Asia central				
Armenia		54.0	60.0	49.2
Belarus		62.8	61.4	23.8
Georgia			36.2	1.3
Kirguistán		6.9		1.1
Moldova, República de		38.3	37.1	34.7
Rumania			18.0	14.1
Ucrania	39.4	48.9	21.2	8.1
Europa occidental				
Macedonia, Ex República Yugoslava de		33.9	26.7	9.9
África del Norte y Oriente Medio				
Marruecos			6.9	72.2
Turquía				21.7
Caribe				
Jamaica				26.1†
América Latina				
Argentina		55.9		69.4
Costa Rica		48.8		
Perú		72.6		
(N = 24)		(N = 24)		

*Los datos del informe son de 2005, pero la recopilación de datos puede variar entre 2003 y 2005

**Profesionales del sexo femeninas

†Trabajadores sexuales comerciales

ECPB-6: Profesionales del sexo—Uso del preservativo			
País	2005		
	Informe de país del UNGASS, 2005*		
	Porcentaje de profesionales del sexo masculinos y femeninos que comunican haber utilizado un preservativo con su cliente más reciente		
	Todos	Varones	Mujeres
África subsahariana			
Burkina Faso	95.9		
Burundi	73.7		73.8
Senegal	86.3		86.6
Asia oriental y Pacífico			
China			68.5
Mongolia	94.1	50.0	96.4
Asia meridional y sudoriental			
Bangladesh	39.8	44.1	31.8
Camboya	96.0		96.0
Indonesia	54.7	47.5	56.2
Lao, República Democrática Popular	83.2	58.8	88.9
Nepal	67.1		
Pakistán	22.6	6.6	37.0
Sri Lanka			64.9
Viet Nam	90.4		90.4
Europa oriental y Asia central			
Armenia	89.2	100.0†	89.2
Belarús	77.4	100.0†	77.3
Georgia			95.0
Kirguistán	80.9		
Moldova, República de	98.4††		
Rumania			85.0
Federación de Rusia	77.0		
Europa occidental			
Macedonia, Ex República Yugoslava de	85.9	87.5	84.4
África del Norte y Oriente Medio			
Marruecos	37.7		37.8
Caribe			
Jamaica	84.3		
América Latina			
Panamá	91.5	90.8	91.6
(N = 24)		(N = 24)	

*Los datos del informe son de 2003, pero la recopilación de datos puede variar entre 2003 y 2005

†Datos sometidos a revisión en el momento de imprimir el informe

††Trabajadores sexuales comerciales

ECPB-7: Varones que tienen relaciones sexuales con varones—Uso del preservativo			
País	2005		
	Informe de país del UNGASS, 2005*		
	Porcentaje de varones que comunican haber utilizado un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja sexual masculina		
	Todos	Edad <25	Edad 25+
África subsahariana			
Congo	23.3	23.5	23.1
Senegal	44.5		44.7
Asia oriental y Pacífico			
China	41.1		
Mongolia	13.0	17.6	10.3
Oceania			
Fiji	20.0		
Asia meridional y sudoriental			
Bangladesh	49.2	52.9	48.8
Indonesia	47.6	45.6	48.6
Pakistán	7.6	9.8	4.9
Europa oriental y Asia central			
Armenia	30.4	40.0	12.5
Belarús	61.6	57.2	66.0
Georgia	53.6		
Kirguistán	68.3		
Moldova, República de	63.0	60.5	64.9
Federación de Rusia	38.8		
Ucrania	71.6	71.1	71.9
Europa occidental			
Macedonia, Ex República Yugoslava de	29.2		
América Latina			
Panamá	84.2	83.8	84.4
Perú	46.3	47.2	45.5
Países de ingresos altos			
Estados Unidos			50.5
(N = 19)		(N = 19)	

*Los datos del informe son de 2005, pero la recopilación de datos puede variar entre 2003 y 2005

ECPB-8: Consumidores de drogas intravenosas—Prácticas sexuales y de inyección seguras					
País	2005				
	Informe de país del UNGASS, 2005*				
	Porcentaje de consumidores de drogas intravenosas que han adoptado comportamientos que reducen la transmisión del VIH (por ej., evitan usar equipo de inyección no estéril y utilizan preservativo) en el último mes (para países en los que el consumo de drogas intravenosas es una vía reconocida de transmisión del VIH)				
	Todas edades	Edad < 25		Edad 25 +	
	Todos	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Asia oriental y Pacífico					
China	-	-	-	-	-
Asia meridional y sudoriental					
Bangladesh	-	8.3	31.3	16.2	68.3
Indonesia	-	18.9	27.3	19.2	8.7
Nepal	-	-	-	-	-
Pakistán	-	-	-	-	-
Tailandia	-	18.8	28.6	27.4	15.6
Viet Nam	-	81.8		89.1	
Europa oriental y Asia central					
Armenia	-	46.4	66.7	30.6	33.3
Belarús	-	50.7	66.7	45.8	43.5
Georgia	-	-	-	-	-
Kirguistán	-	-	-	-	-
Letonia	-	-	-	-	-
Moldova, República de	-	61.9	57.1	37.3	36.2
Rumania	-	-	-	1.5	0.9
Ucrania	-	18.3	21.3	20.6	17.4
Europa occidental					
Macedonia, Ex República Yugoslava de	-	28.7	18.5	30.7	35
Serbia y Montenegro	20.1**	2.0†	-	-	-
África del Norte y Oriente Medio					
Argelia	-				
(N = 18)			(N = 18)		

*Los datos del informe son de 2005, pero la recopilación de datos puede variar entre 2003 y 2005

**Valor relativo a Serbia

†Valor relativo a Montenegro

(-) = Sometido a revisión en el momento de imprimir el informe

NOTAS SOBRE LOS INDICADORES ESPECÍFICOS

Para más detalles sobre los siguientes indicadores, véase: *Directrices para el desarrollo de indicadores básicos* (2005), ONUSIDA.

Indicadores de epidemia generalizada

Desde el *Informe sobre los progresos realizados en la respuesta mundial a la epidemia de VIH/SIDA* (2003) se desarrollaron nuevos indicadores básicos para comprender mejor la naturaleza y la amplitud de la respuesta al VIH y al SIDA a nivel nacional. Además, hoy existen recomendaciones para el uso de series independientes de indicadores para los países con epidemias generalizadas y para los que tienen epidemias concentradas o de prevalencia baja.

Para los países con epidemias generalizadas hay cinco nuevos indicadores básicos (véase el Recuadro 1). (Nótese que uno de los indicadores nacionales originales —porcentaje de consumidores de drogas intravenosas que han adoptado comportamientos que reducen la transmisión del VIH— se ha trasladado a la serie de indicadores para países con epidemias concentradas o de prevalencia baja.)

RECUADRO 1: CINCO NUEVOS INDICADORES BÁSICOS PARA EPIDEMIAS GENERALIZADAS:

- Porcentaje de niños huérfanos o vulnerables cuyas familias recibieron apoyo externo básico para atenderlos.
- Porcentaje de unidades de sangre transfundida analizadas para detección del VIH.
- Porcentaje de mujeres y varones jóvenes que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad.
- Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15–24 años que en los últimos 12 meses tuvieron relaciones sexuales con una pareja no marital y con la que no convivían.
- Porcentaje de adultos y niños VIH-positivos que siguen con vida y de los cuales se sabe que continuaban el tratamiento antirretrovírico 12 meses después de haberlo iniciado.

1. EG-1: FONDOS NACIONALES PROCEDENTES DE FUENTES INTERNAS DESEMBOLSADOS POR LOS GOBIERNOS PARA EL SIDA

Este indicador es una aproximación global a la vigilancia del gasto relativo al VIH y al SIDA en todos los sectores. Se mide por medio de la ejecución de las Evaluaciones del gasto nacional relativo al SIDA, o por medio de un estudio teórico u otras medidas aproximadas. Es aplicable a todos los países, incluidos aquellos con epidemias concentradas y de prevalencia baja.

Definición y componentes de los indicadores:

- **Informe de país del UNGASS:** Cantidad de fondos nacionales desembolsados por los gobiernos de países de ingresos bajos y medianos.

El objetivo es medir el gasto de las instituciones gubernamentales u otras instituciones públicas procedente de sus propias fuentes, a nivel central o descentralizado; se excluyen los fondos procedentes de fuentes internacionales (aun cuando dichos fondos los distribuya el gobierno del país).

El gráfico recapitulativo de indicadores se compiló para ilustrar la evolución seguida desde 2001, cuando se aprobó la Declaración de compromiso sobre el VIH/SIDA, hasta finales de 2005. Entre las fuentes utilizadas para la confección de dicho gráfico figuran informes preparados por los países para la revisión de la Declaración de compromiso y otras fuentes presentadas por miembros del Consorcio del ONUSIDA para el Seguimiento de Recursos Mundiales.

La mayor parte de los países informó sobre el último año disponible; se utilizaron varias metodologías en la elaboración de este indicador. Entre ellas puede mencionarse la aplicación del marco Evaluaciones del gasto nacional relativo al SIDA, tal como lo recomienda el ONUSIDA, que mide los gastos reales por funciones de política pertinentes para el suministro de servicios sobre el SIDA. Entre otras fuentes de información utilizadas por los países que enviaron informes figuran el análisis del presupuesto para el SIDA, estudios teóricos sobre la ejecución de los presupuestos, informes relativos al proyecto sobre flujos de recursos (UNFPA/ONUSIDA/NIDI) sobre gastos, revisiones de actividades de los programas nacionales y subanálisis de la contabilidad nacional en materia de salud.

Cuando estaban disponibles, se seleccionaron las mejores estimaciones para el periodo 2001–2005, es decir, las que reflejan los gastos reales. Asimismo se intentó separar y deducir los fondos internacionales recibidos por los gobiernos a fin de aislar el gasto propio de los países.

En los casos en que los países tenían un préstamo o crédito pendiente de pago concedido por un banco de desarrollo, se realizó el esfuerzo de separar la parte reembolsable de dichos préstamos. Esa parte se clasificó como gasto interno junto con el contravalor nacional y las sumas pagadas para la ejecución del proyecto en el año civil cuando se mencionaba este dato.

No se han incluido los países que han informado sobre este indicador con cifras en proceso de revisión. Otras son estimaciones previas, y los totales pueden cambiar cuando se disponga de información suplementaria.

2. EG-3: EDUCACIÓN ESCOLAR SOBRE EL VIH BASADA EN LAS APTITUDES PARA LA VIDA

La finalidad de este indicador es evaluar los progresos realizados en la puesta en práctica de la educación sobre el VIH basada en las aptitudes para la vida en todas las escuelas. Es aplicable a todos los países y se mide cada dos años por medio de encuestas realizadas en las escuelas o revisiones de los programas educativos.

Definición y componentes del indicador:

- **Informe de país del UNGASS:** Porcentaje de escuelas con maestros que han recibido formación en educación sobre el VIH basada en aptitudes para la vida y que la impartieron en el último año.

Numerador: Número de escuelas con miembros del personal que han recibido formación en educación sobre el VIH basada en las aptitudes para la vida y que la imparten regularmente.

Denominador: Número de escuelas encuestadas.

3. EG-4: CONTROL DEL VIH Y EL SIDA EN EL LUGAR DE TRABAJO

La finalidad de este indicador es evaluar los progresos realizados en la ejecución de las políticas y los programas para luchar contra el VIH en el lugar de trabajo. Es aplicable a todos los países y se mide cada dos años por medio de una encuesta realizada a una muestra representativa de los principales empleadores de los sectores tanto público como privado. Entre los empleadores del sector público deberían incluirse, como mínimo, los ministerios de transporte, trabajo, educación y salud. Los empleadores del sector privado deberían seleccionarse según el tamaño de su mano de obra.

Definición y componentes del indicador:

- **Informe de país del UNGASS:** Porcentaje de grandes empresas públicas y privadas que han adoptado políticas integrales sobre el VIH y el SIDA en el lugar de trabajo.

Numerador: Número de empleadores que han adoptado políticas y programas integrales sobre el VIH y el SIDA (tal como se definen en las Directrices del ONUSIDA para el desarrollo de indicadores básicos, 2005)

Denominador: Número de empleadores encuestados.

4. EG-5: INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL—MANEJO INTEGRAL DE CASOS

La finalidad de este indicador es evaluar los progresos efectuados en el diagnóstico, tratamiento y asesoramiento universalmente eficaces de las infecciones de transmisión sexual. Es aplicable a todos los países y se mide cada dos años por medio de encuestas realizadas en establecimientos de salud.

Definición y componentes del indicador:

- **Informe de país del UNGASS:** Porcentaje de mujeres y varones con infecciones de transmisión sexual en establecimientos de salud que recibieron un diagnóstico, asesoramiento y tratamiento apropiados.

Numerador: Número de pacientes con infecciones de transmisión sexual para quienes se siguieron los procedimientos correctos en lo relativo a: a) realización del historial clínico; b) examen; c) diagnóstico y tratamiento; y d) asesoramiento eficaz para la notificación a la pareja, el uso del preservativo y las pruebas del VIH.

Denominador: Número de pacientes con infecciones de transmisión sexual con los que se observaron interacciones proveedor-cliente.

5. EG-6: PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN MATERNOINFANTIL—PROFILAXIS ANTIRRETROVÍRICA

La finalidad de este indicador es evaluar los progresos realizados en la prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH. Es aplicable a todos los países y se mide cada dos años por medio de vigilancia de los programas y estimaciones.

Definición y componentes del indicador:

■ **Informe de país del UNGASS:** Porcentaje de mujeres embarazadas infectadas por el VIH que recibieron un ciclo terapéutico completo de profilaxis antirretrovírica para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil.

Numerador: Número de mujeres embarazadas infectadas por el VIH que en los últimos 12 meses recibieron un ciclo terapéutico completo de profilaxis antirretrovírica para reducir la transmisión maternoinfantil, conforme al protocolo de tratamiento aprobado a nivel nacional (o según las normas OMS/ONUSIDA).

Denominador: Número estimado de mujeres embarazadas infectadas por el VIH.

Otra fuente de datos disponible:

Encuesta de cobertura: para más detalles relativos a la encuesta, véase: Cobertura de servicios seleccionados para la prevención, atención y apoyo relacionados con el VIH/SIDA en países de ingresos bajos y medianos en 2003 (junio de 2004), USAID, ONUSIDA, OMS, UNICEF y Proyecto POLICY.

6. EG-7: TRATAMIENTO DEL VIH—TERAPIA ANTIRRETROVÍRICA DE COMBINACIÓN

La finalidad de este indicador es evaluar los progresos realizados en el suministro de terapia antirretrovírica a todas las personas con infección por el VIH avanzada. Es aplicable a todos los países y se mide cada dos años por medio de vigilancia de los programas.

Definición y componentes del indicador:

■ **Informe de país del UNGASS:** Porcentaje de personas con infección por el VIH avanzada que recibían terapia antirretrovírica de combinación.

Numerador: Número de personas con infección por el VIH avanzada que recibían terapia antirretrovírica de combinación conforme al protocolo de tratamiento aprobado a nivel nacional (o según las normas OMS/ONUSIDA). Se calcula como sigue: número de personas que reciben tratamiento al comenzar el año más el número de personas que comenzaron el tratamiento en los 12 meses anteriores menos el número de personas cuyo tratamiento terminó en los 12 meses anteriores (incluidas las que fallecieron).

Denominador: Número de personas con infección por el VIH avanzada reconocida (por ej., las que necesitan terapia antirretrovírica de combinación).

Otras fuentes de datos disponibles:

Encuesta de cobertura: cobertura de la terapia antirretrovírica para el VIH y el SIDA. Para más detalles relativos a la encuesta, véase: Cobertura de servicios seleccionados para la prevención, atención y apoyo relacionados con el VIH y el SIDA en países de ingresos bajos y medianos en 2003 (junio de 2004), USAID, ONUSIDA, OMS, UNICEF y Proyecto POLICY.

Iniciativa “Tres millones para 2005”: cobertura de la terapia antirretrovírica (diciembre de 2005). Para más detalles, véase: Progresos realizados en el acceso universal a la terapia antirretrovírica para el VIH. Informe sobre la iniciativa “Tres millones para 2005” y más allá (marzo de 2006), OMS y ONUSIDA.

7. EG-8: APOYO A LOS NIÑOS AFECTADOS POR EL VIH Y EL SIDA

La finalidad de este indicador es evaluar los progresos realizados en el suministro de apoyo a las familias que atienden a niños huérfanos o vulnerables; se mide cada 4–5 años en los países con una prevalencia alta del VIH, por medio de encuestas de población como las Encuestas Demográficas y de Salud y las Encuestas a base de indicadores múltiples.

Definición y componentes del indicador:

■ **Informe de país del UNGASS:** Porcentaje de niños huérfanos o vulnerables cuyas familias recibieron apoyo externo básico para atenderlos.

Numerador: Número de niños huérfanos o vulnerables que viven en familias que respondieron afirmativamente a como mínimo una de las cuatro preguntas relativas al tipo y frecuencia del apoyo

recibido (familias que recibieron apoyo médico en los últimos 12 meses; apoyo escolar en los últimos 12 meses; apoyo emocional/psicológico en los últimos tres meses, o apoyo social en los últimos tres meses.)

Denominador: Número total de niños huérfanos o vulnerables.

8. EG-9: SEGURIDAD HEMATOLÓGICA

La finalidad de este indicador es evaluar los progresos realizados en las pruebas sistemáticas de detección del VIH en las unidades de sangre para transfusión. Es aplicable a todos los países y se mide cada dos años utilizando el protocolo de seguridad hematológica *Evaluation de MEASURE*.

Definición y componentes del indicador:

■ **Informe de país del UNGASS:** Porcentaje de unidades de sangre transfundida analizadas para detección del VIH.

Numerador: Número de unidades de sangre que se analizaron para la detección del VIH en los últimos 12 meses conforme a las normas nacionales o de la OMS.

Denominador: Número de unidades de sangre transfundidas en los últimos 12 meses.

Otra fuente de datos disponible:

Encuesta de cobertura: porcentaje de unidades de sangre para transfusión analizadas para la detección del VIH. Para más detalles, véase: Cobertura de servicios seleccionados para la prevención, atención y apoyo relacionados con el VIH/SIDA en países de ingresos bajos y medianos en 2003 (junio de 2004), USAID, ONUSIDA, OMS, UNICEF y Proyecto POLICY.

9. EG-10: JÓVENES—CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DEL VIH

La finalidad de este indicador es evaluar los progresos realizados en el conocimiento universal de los datos esenciales acerca de la transmisión del VIH. Es un indicador aplicable a todos los países y debería medirse, como mínimo, cada 4–5 años; no obstante, sería preferible que se midiese cada dos años. El indicador se mide utilizando encuestas de población, tales como las Encuestas Demográficas y de Salud, las Encuestas a base de indicadores múltiples y las Encuestas sobre comportamiento (sección jóvenes).

Objetivos: 2005—90%; 2010—95%

Definición y componentes del indicador:

■ **Informe de país del UNGASS:** Porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años de edad que identifican correctamente los diversos medios de prevenir la transmisión sexual del VIH y rechazan las principales ideas erróneas.

Numerador: Número de encuestados de 15–24 años de edad que respondieron correctamente a las cinco preguntas relativas a la transmisión del VIH.

1. ¿Puede reducirse el riesgo de transmisión del VIH teniendo relaciones sexuales con una pareja fiel y no infectada?
2. ¿Puede reducirse el riesgo de transmisión del VIH utilizando un preservativo?
3. ¿Puede tener el VIH una persona de aspecto saludable?
4. ¿Se puede contraer la infección por el VIH por picaduras de mosquito?
5. ¿Se puede contraer la infección por el VIH por compartir una comida con una persona infectada?

Denominador: Número de encuestados de 15–24 años de edad que respondieron a las cinco preguntas (incluidos los que respondieron “no sé”).

Otra fuente de datos disponible:

Encuestas Demográficas y de Salud: porcentaje de los encuestados que identifican correctamente los dos medios principales para prevenir la transmisión sexual del VIH (utilizar el preservativo y limitar las relaciones sexuales a una pareja fiel y no infectada), rechazan las dos ideas erróneas locales más comunes y saben que una persona de aspecto saludable puede tener el VIH.

10. EG-11: RELACIONES SEXUALES ANTES DE LOS 15 AÑOS

La finalidad de este indicador es evaluar los progresos realizados en el retraso de la edad en la que las mujeres y varones jóvenes de 15–24 años tienen su primera relación sexual. Es aplicable a todos los países y debería medirse cada 4–5 años por medio de encuestas de población, tales como las Encuestas

Demográficas y de Salud, las Encuestas a base de indicadores múltiples y las Encuestas sobre comportamiento (sección jóvenes).

Definición y componentes del indicador:

■ **Informe de país del UNGASS:** Porcentaje de mujeres y varones jóvenes que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años.

Numerador: Número de encuestados de 15–24 años de edad que comunican haber tenido relaciones sexuales antes de los 15 años.

Denominador: Número de encuestados de 15–24 años de edad.

Otra fuente de datos disponible:

Encuestas Demográficas y de Salud: porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15–19 años de edad que tuvieron su primera relación sexual a la edad de 15 años.

11. EG-12: RELACIONES SEXUALES DE ALTO RIESGO ENTRE MUJERES Y VARONES JÓVENES

La finalidad de este indicador es evaluar los progresos realizados en la reducción del porcentaje de jóvenes de 15–24 años de edad que tienen relaciones sexuales de alto riesgo. Es aplicable a todos los países y debería medirse cada 4–5 años por medio de encuestas de población, tales como las Encuestas Demográficas y de Salud, las Encuestas a base de indicadores múltiples y las Encuestas sobre comportamiento (sección jóvenes).

Definición y componentes del indicador:

■ **Informe de país del UNGASS:** Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15–24 años de edad que en los últimos 12 meses tuvieron relaciones sexuales con una pareja no marital y con la que no convivían.

Numerador: Número de encuestados de 15–24 años de edad que en los últimos 12 meses han tenido relaciones sexuales con una pareja no marital ni con la que no convivían.

Denominador: Número de encuestados de 15–24 años de edad que comunican haber tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses.

Otra fuente de datos disponible:

Encuestas Demográficas y de Salud: porcentaje de encuestados de 15–24 años de edad que en los últimos 12 meses tuvieron relaciones sexuales con una pareja no marital y con la que no convivían, de todos los encuestados que comunican haber tenido actividad sexual en los últimos 12 meses.

12. EG-13: JÓVENES—USO DEL PRESERVATIVO CON PAREJAS OCASIONALES

La finalidad de este indicador es evaluar los progresos realizados en la prevención de la exposición precoz al VIH a través de relaciones sexuales no protegidas con parejas ocasionales. Es aplicable a todos los países y debería medirse, como mínimo, cada 4–5 años; no obstante, sería preferible que se midiera cada dos años. Se mide por medio de encuestas a la población, tales como las Encuestas Demográficas y de Salud, las Encuestas a base de indicadores múltiples y las Encuestas sobre comportamiento (sección jóvenes).

Definición y componentes del indicador:

■ **Informe de país del UNGASS:** Porcentaje de jóvenes de 15–24 años de edad que comunican haber utilizado un preservativo durante las relaciones sexuales con una pareja ocasional.

Numerador: Número de encuestados de 15–24 de edad que comunican haber tenido una pareja ocasional (por ej., con la que no convivían ni estaban casados) en los últimos 12 meses y que también notificaron haber utilizado un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con dicha persona.

Denominador: Número de encuestados de 15–49 años de edad que comunican haber tenido una pareja sexual ocasional en los últimos 12 meses.

Otra fuente de datos disponible:

Encuestas Demográficas y de Salud: porcentaje de encuestados que en los últimos 12 meses tuvieron relaciones sexuales con una pareja no marital y con la que no convivían, de todos los encuestados que

comunican haber utilizado un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja semejante.

13. EG-14: HUÉRFANOS—ASISTENCIA A LA ESCUELA

La finalidad de este indicador es evaluar los progresos realizados en la prevención de la desventaja relativa en lo que se refiere a la asistencia a la escuela entre los huérfanos y los no huérfanos. Este indicador se aplica a todos los países y se mide por medio de encuestas de población, tales como las Encuestas Demográficas y de Salud, las Encuestas a base de indicadores múltiples y otras encuestas representativas. Debería medirse, como mínimo, cada 4–5 años; no obstante, sería preferible que se midiese cada dos años.

Definición y componentes del indicador:

- **Informe de país del UNGASS:** Razón de asistencia escolar actual entre huérfanos y no huérfanos de 10–14 años.

Asistencia de los huérfanos a la escuela

Numerador: Número de niños que han perdido a los dos padres y continúan asistiendo a la escuela.

Denominador: Número de niños que han perdido a los dos padres.

Asistencia de los no huérfanos a la escuela

Numerador: Número de niños cuyos dos padres siguen con vida y que viven al menos con uno de ellos y asisten a la escuela.

Denominador: Número de niños cuyos dos padres siguen con vida y que viven al menos con uno de ellos.

Otra fuente de datos disponible:

Encuestas Demográficas y de Salud: razón de la proporción de huérfanos (la madre y el padre fallecidos) de 10–14 años que asisten a la escuela frente a la proporción de no huérfanos de 10–14 años (que viven al menos con uno de los padres) que asisten a la escuela.

14. EG-16: TRATAMIENTO DEL VIH—SUPERVIVENCIA DESPUÉS DE 12 MESES EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVÍRICO

La finalidad de este indicador es evaluar los progresos realizados en el aumento de la supervivencia entre adultos y niños infectados que siguen tratamiento antirretrovírico. Es aplicable a todos los países y se mide cada dos años por medio de la vigilancia de los programas.

Definición y componentes del indicador:

- **Informe de país del UNGASS:** Porcentaje de adultos y niños con el VIH que siguen con vida y de los cuales se sabe que continuaban el tratamiento antirretrovírico 12 meses después de haberlo iniciado.

Numerador: Número de adultos y niños que siguen ininterrumpidamente el tratamiento antirretrovírico 12 meses después de haberlo iniciado.

Denominador:

- a) Supervivencia mínima: número total de adultos y niños que comenzaron el tratamiento antirretrovírico en el grupo de inicio de la terapia 12 meses atrás, incluidos los que han interrumpido el tratamiento, los que se han trasladado a otro centro y las personas perdidas en el seguimiento.
- b) Supervivencia máxima: número total de adultos y niños que comenzaron el tratamiento antirretrovírico en el grupo de inicio de la terapia 12 meses atrás, excluidos los que han interrumpido el tratamiento, los que se han trasladado a otro centro y las personas perdidas en el seguimiento.

Indicadores de epidemia concentrada o de prevalencia baja

Desde el *Informe sobre los progresos realizados en la respuesta mundial a la epidemia de VIH/SIDA* (2003) se desarrollaron nuevos indicadores básicos para comprender mejor la naturaleza y la amplitud de la respuesta al VIH y al SIDA a nivel nacional. Además, hoy existen recomendaciones para el uso de series independientes de indicadores para los países con epidemias generalizadas y los que tienen epidemias concentradas o de prevalencia baja.

Para los países con epidemias concentradas o de prevalencia baja, la serie de nueve indicadores de prioridades incluye cuatro indicadores de la categoría compromiso y acción nacional, cuatro de la categoría conocimientos y comportamiento y uno de la categoría impacto (véase el Recuadro 2).

RECUADRO 2: NUEVE INDICADORES BÁSICOS PARA EPIDEMIAS CONCENTRADAS O DE PREVALENCIA BAJA:

- Cantidad de fondos nacionales desembolsados por los gobiernos de países de ingresos bajos y medianos.
- Índice compuesto de política nacional
- Porcentaje de [las poblaciones más expuestas] que se sometieron a la prueba del VIH en los últimos 12 meses y conocen el resultado.
- Porcentaje de [las poblaciones más expuestas] atendidas por programas de prevención del VIH y el SIDA.
- Porcentaje de [las poblaciones más expuestas] que identifican correctamente los diferentes medios para prevenir la transmisión sexual del VIH y rechazan las principales ideas erróneas sobre la transmisión del VIH.
- Porcentaje de profesionales del sexo masculinos y femeninos que comunican haber utilizado un preservativo con su cliente más reciente.
- Porcentaje de varones que comunican haber utilizado un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales anales con una pareja masculina.
- Porcentaje de consumidores de drogas intravenosas que han adoptado comportamientos que reducen la transmisión del VIH, por ej., evitan compartir equipo de inyección y utilizan el preservativo, en el último mes (*aplicable sólo a países en los que el consumo de drogas intravenosas es una vía reconocida de transmisión del VIH*).
- Porcentaje de [poblaciones más expuestas] infectadas por el VIH (*indicador del impacto*).

Los países con epidemias generalizadas pueden también tener una subepidemia concentrada entre una o más de las poblaciones más expuestas. En ese caso, sería muy útil para ellos calcular e informar sobre los indicadores para esas poblaciones.

1. ECPB-3: POBLACIONES MÁS EXPUESTAS—PRUEBA DEL VIH

La finalidad de este indicador es evaluar los progresos realizados en las pruebas y el asesoramiento del VIH entre las poblaciones más expuestas. Este indicador es aplicable a los países con epidemias concentradas o de prevalencia baja, incluidos los países con subepidemias concentradas dentro de una epidemia generalizada. Se mide cada dos años por medio de la vigilancia de los programas o de encuestas especiales, tales como la Encuesta de vigilancia del comportamiento de Family Health International.

Definición y componentes del indicador:

- **Informe de país del UNGASS:** Porcentaje de [poblaciones más expuestas] que se sometieron a la prueba del VIH en los últimos 12 meses y conocen el resultado.

El término “poblaciones más expuestas” incluido en la definición debería reemplazarse por el segmento específico de la población medida en cada caso (por ej., profesionales del sexo, consumidores de drogas intravenosas, varones que tienen relaciones sexuales con varones). En los países con múltiples poblaciones de alto riesgo, debería informarse sobre los indicadores correspondientes a cada una de ellas.

Numerador: Número de encuestados [de la población más expuesta] que se sometieron a la prueba del VIH durante los últimos 12 meses y conocen el resultado.

Denominador: Número de encuestados [de la población más expuesta] incluidos en la muestra o métodos de estimación de la prevalencia para el tamaño de la población más expuesta para el denominador.

2. ECPB-4: POBLACIONES MÁS EXPUESTAS—PROGRAMAS DE PREVENCIÓN

La finalidad de este indicador es evaluar los progresos realizados en la ejecución de los programas de prevención del VIH entre las poblaciones más expuestas. Este indicador se aplica a todos los países con

epidemias concentradas o de prevalencia baja, incluidos los países con subepidemias concentradas dentro de una epidemia generalizada. Se mide cada dos años por medio de la vigilancia de los programas o de encuestas especiales, tales como la Encuesta de vigilancia del comportamiento de Family Health International.

Definición y componentes del indicador:

- **Informe de país del UNGASS:** Porcentaje de [las poblaciones más expuestas] atendidas por programas de prevención del VIH.

El término “poblaciones más expuestas” incluido en la definición debería reemplazarse por el segmento específico de la población medida en cada caso (por ej., profesionales del sexo, consumidores de drogas intravenosas, varones que tienen relaciones sexuales con varones). En los países con múltiples poblaciones de alto riesgo, debería informarse sobre los indicadores correspondientes a cada una de ellas.

Numerador: Número de encuestados [de la población más expuesta] atendidos por al menos un programa de prevención del VIH en los últimos 12 meses. Según los contextos locales, los programas de prevención pueden incluir: divulgación y educación inter pares, contactos con medios de comunicación seleccionados, detección o tratamiento de infecciones de transmisión sexual, asesoramiento y pruebas del VIH, y terapia de sustitución y prácticas de inyección más seguras para los consumidores de drogas intravenosas.

Denominador: Número de encuestados [de la población más expuesta] incluidos en la muestra o métodos de estimación de la prevalencia para el tamaño de la población más expuesta para el denominador.

Otra fuente de datos disponible:

Encuesta de cobertura: porcentaje [de la población más expuesta] atendido por intervención cada año. Para más detalles relativos a la encuesta de cobertura, véase: Cobertura de servicios escogidos para la prevención, la atención y el apoyo en relación con el VIH/SIDA en los países de ingresos bajos y medianos en 2003 (junio de 2004), USAID, ONUSIDA, OMS, UNICEF y Proyecto POLICY.

3. ECPB-5: POBLACIONES MÁS EXPUESTAS—CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DEL VIH

La finalidad de este indicador es evaluar los progresos realizados en el desarrollo de los conocimientos relativos a los hechos básicos acerca de la transmisión del VIH entre las poblaciones más expuestas. Este indicador es aplicable a todos los países con epidemias concentradas o de prevalencia baja, incluidos los países con subepidemias concentradas dentro de una epidemia generalizada. Se mide cada dos años por medio de encuestas especiales, tales como la Encuesta de vigilancia del comportamiento de Family Health International.

Definición y componentes del indicador:

- **Informe de país del UNGASS:** Porcentaje de [las poblaciones más expuestas] que identifican correctamente los diferentes medios para prevenir la transmisión sexual del VIH y rechazan las principales ideas erróneas sobre la transmisión del VIH.

Numerador: Número de encuestados [de la población más expuesta] que respondieron correctamente a las cinco preguntas relativas a la transmisión del VIH.

1. ¿Puede reducirse el riesgo de transmisión del VIH teniendo relaciones sexuales con una pareja fiel y no infectada?
2. ¿Puede reducirse el riesgo de transmisión del VIH utilizando el preservativo?
3. ¿Puede tener el VIH una persona de aspecto saludable?
4. ¿Se puede contraer la infección por el VIH por picaduras de mosquito?
5. ¿Se puede contraer la infección por el VIH por compartir una comida con una persona infectada?

Denominador: Número de encuestados [de la población más expuesta] que respondieron a las cinco preguntas, incluidos los que respondieron “no sé.”

4. ECPB-6: PROFESIONALES DEL SEXO—USO DEL PRESERVATIVO

La finalidad de este indicador es evaluar los progresos realizados en la prevención de la exposición al VIH entre los profesionales del sexo debida a las relaciones sexuales sin protección con sus clientes. Este indicador es aplicable a todos los países con epidemias concentradas o de prevalencia baja, incluidos los países con subepidemias concentradas dentro de una epidemia generalizada. Se mide cada dos años por medio de encuestas especiales, tales como la Encuesta de vigilancia del comportamiento de Family Health International.

Definición y componentes del indicador:

■ **Informe de país del UNGASS:** Porcentaje de profesionales del sexo femeninos y masculinos que comunican haber utilizado un preservativo con su cliente más reciente.

Numerador: Número de encuestados que comunican haber utilizado un preservativo con su último cliente en los últimos 12 meses.

Denominador: Número de encuestados que comunican haber tenido relaciones sexuales remuneradas en los últimos 12 meses.

Otra fuente de datos disponible:

Encuesta de cobertura: para más detalles relativos a la encuesta, véase: Cobertura de servicios seleccionados para la prevención, atención y apoyo relacionados con el VIH y el SIDA en los países de ingresos bajos y medianos en 2003 (junio de 2004), USAID, ONUSIDA, OMS, UNICEF y Proyecto POLICY.

5. ECPB-7: VARONES QUE TIENEN RELACIONES SEXUALES CON VARONES—USO DEL PRESERVATIVO

La finalidad de este indicador es evaluar los progresos realizados en la prevención de la exposición al VIH entre varones que tienen relaciones sexuales anales sin protección con una pareja masculina. Este indicador es aplicable a todos los países con epidemias concentradas o de prevalencia baja, incluidos los países con subepidemias concentradas dentro de una epidemia generalizada. Se mide cada dos años por medio de encuestas especiales, tales como la Encuesta de vigilancia del comportamiento de Family Health International.

Definición y componentes del indicador:

■ **Informe de país del UNGASS:** Porcentaje de varones que comunican haber utilizado un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales anales con una pareja masculina.

Numerador: Número de encuestados que comunican haber utilizado un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales anales.

Denominador: Número de encuestados que comunican haber tenido relaciones sexuales con una pareja masculina en los últimos seis meses.

6. ECPB-8: CONSUMIDORES DE DROGAS INTRAVENOSAS—PRÁCTICAS DE INYECCIÓN Y SEXUALES SEGURAS

La finalidad de este indicador es evaluar los progresos realizados en la prevención de la transmisión del VIH asociada al consumo de drogas intravenosas. Este indicador se aplica a todos los países en los que el consumo de drogas intravenosas es una vía reconocida de transmisión del VIH; se mide cada dos años por medio de encuestas especiales, tales como la Encuesta de vigilancia del comportamiento de Family Health International para consumidores de drogas intravenosas.

Definición y componentes del indicador:

■ **Informe de país del UNGASS:** Porcentaje de consumidores de drogas intravenosas que han adoptado comportamientos que reducen la transmisión del VIH, por ej., evitaron usar equipos de inyección no estéril y utilizaron preservativos en los últimos 12 meses.

Numerador: Número de encuestados que comunican no haber utilizado equipo de inyección no estéril durante el último mes y que también comunican haber utilizado un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales.

Denominador: Número de encuestados que comunican haber consumido drogas intravenosas y haber tenido relaciones sexuales durante el último mes.

Descripciones — Recursos adicionales

Encuesta de cobertura

El presente estudio se propuso medir la cobertura nacional para varios servicios básicos mediante la compilación de estadísticas sobre servicios y el asesoramiento de expertos. La información se recopiló en cada país por medio de consultores nacionales, quienes identificaron a informantes bien informados para cada servicio. A los informantes se les pidió que proporcionaran estadísticas sobre el número de personas que recibieron el servicio durante el último año, en caso de que esta información estuviese disponible.

Asimismo, se les pidió que calculasen el porcentaje de población que necesita el servicio que ha tenido acceso a él. Los consultores utilizaron un cuestionario normalizado.

El estudio se centra en los servicios que pueden medirse con mayor facilidad. El Recuadro 3 muestra los servicios incluidos en el estudio.

RECUADRO 3: SERVICIOS BÁSICOS SOBRE EL VIH/SIDA INCLUIDOS EN EL PRESENTE ESTUDIO:

- **Asesoramiento y pruebas voluntarias.** Servicios que proporcionan asesoramiento previo a las pruebas; pruebas de la infección por el VIH y asesoramiento posterior a las pruebas a todos los que quieran conocer su estado serológico. No incluyen las pruebas hechas con finalidad médica a pacientes de hospitales.
- **Prevención de la transmisión maternoinfantil.** Servicios que proporcionan asesoramiento y pruebas voluntarias a mujeres embarazadas y servicios de prevención a las VIH-positivas. Los servicios de prevención deberían incluir el tratamiento con zidovudina, nevirapina u otros fármacos antirretrovíricos, y pueden también incluir asesoramiento sobre lactancia materna y alimentación suplementaria.
- **Preservativos.** El número de preservativos distribuidos anualmente.
- **Reducción de daños.** Servicios para reducir los riesgos asociados al consumo de drogas intravenosas, incluidas la educación y el apoyo a la reducción del riesgo, intercambio de agujas y jeringas, y sustitución de drogas.
- **Educación.** Educación sobre el SIDA para estudiantes de escuelas primarias y secundarias.
- **Atención domiciliaria.** Servicios para la atención domiciliaria de personas infectadas por el VIH, y que proporcionan cuidados paliativos básicos, apoyo psicológico y servicios de planificación.
- **Tratamiento de infecciones oportunistas.** La atención disponible normalizada para pacientes VIH-positivos que necesitan tratamiento para situaciones específicas.
- **Profilaxis para infecciones oportunistas.** Suministro de cotrimoxazol o isoniazida a las personas identificada como VIH-positivas.
- **Terapia antirretrovírica.** Tratamiento de adultos o niños VIH-positivos con una combinación de, como mínimo, tres medicamentos antirretrovíricos.
- **Huérfanos y niños vulnerables.** Servicio de apoyo a los huérfanos y a los niños vulnerables, incluidas ayuda alimentaria, apoyo educativo, atención sanitaria, servicios de protección, apoyo psicológico y autosuficiencia económica.

La cobertura se calcula dividiendo el número de personas que utilizan el servicio por la población que lo necesita.

