

las personas tienen relaciones sexuales no le preguntan a la otra si tiene seguro social o no para saber si usa condón o no. Para mí, en materia de atención médica del sida la situación más crítica la encontramos en el IMSS”.

Y subraya: “El desabasto y la mala atención médica es un problema de calidad de vida y de riesgo de muerte porque probablemente muchos de los que no reciben el medicamento a tiempo o mal recetado pasarán a una etapa más difícil de la enfermedad que pone en riesgo su vida y que, además, requiere de medicinas más caras”.

Las cifras

ONUSIDA estima que hasta finales de 2006 en el mundo existían 39.5 millones de personas que viven con el VIH, de las cuales 37.2 millones son adultas y 2.3 millones menores de 15 años; en este período fallecieron 2.9 millones.

En todo el mundo, cada día se infectan con el virus casi 11 mil personas. Es decir, 4.3 millones de personas contrajeron la infección en 2006 y aproximadamente 40% de las nuevas infecciones se producen en jóvenes de entre 15 y 24 años.

México se clasifica como un país con una epidemia de sida concentrada en los grupos que mantienen prácticas de riesgo: 13.5% de prevalencia en hombres que tienen sexo con hombres, 15% en trabajadores del sexo y 3.9% en hombres usuarios de drogas inyectables.

Por cada cinco casos acumulados de VIH-sida en hombres se observa un caso de mujer. La transmisión sexual ha sido la causante del 92.3% de los casos acumulados, de los cuales 46.7% abarcan a hombres que tienen sexo con hombres, incluidos quienes tienen sexo indistintamente con hombres y mujeres. El 45.6% por ciento corresponde a población heterosexual. El 5.1% se originaron vía sanguínea, de los cuales el 3.3% fue por transfusión, aunque en los recientes cinco años no se han presentado casos de sida asociados a esta práctica; 0.9% están vinculados al consumo de drogas inyectables, 0.5% a donadores y 0.4% a hemofílicos.

La entidad que acumula el mayor número de casos de sida es el Distrito Federal con 20 mil 398, le sigue el Estado de México con 11 mil 319, Veracruz con 9 mil 680, Jalisco con 9 mil 257 y Puebla con 5 mil 312 casos.

De acuerdo con el director del Censida, las campañas de prevención de esta epidemia se han enfocado “a lo que la ciencia y la evidencia muestran que funciona: si el 96% de las nuevas infecciones en México se dan entre personas que sí tienen relaciones sexuales y todas ellas fueron motivadas por el no uso del condón, entonces la prioridad es que las personas que sí tienen relaciones sexuales se protejan y utilicen el condón correctamente”.

También en materia de prevención, Saavedra informó que la Secretaría de Salud inició la oferta de las pruebas de detección del VIH a la totalidad de las mujeres embarazadas que carecen de seguridad social, lo que permitirá evitar prácticamente la infección de recién nacidos.

Para concluir, el director de Censida recuerda que en agosto de 2008 México será sede de la Conferencia Mundial, el encuentro en materia de salud más grande del planeta, en el que se prevé una asistencia de entre 25 mil y 30 mil personas.

“Espero que para entonces podamos mostrar al mundo que en materia de cobertura, abasto de medicamentos y capacitación de personal somos un ejemplo a seguir.” 